# TAURARGIN®
## aspartato de arginina
## taurina
## fosfato de ditetraetilamônio

**FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO**
Caixa contendo 20 drágeas, em blister.

**USO ADULTO**

**COMPOSIÇÃO**
Cada drágea contém:
Aspartato de arginina..... 400 mg
Taurina.....100 mg
Fosfato de ditetraetilamônio ..... 2 mg
Excipientes (estearato de magnésio, povidona, silicato de magnésio, açúcar granulado, goma laca, corante vermelho laca 40, corante azul brilhante laca, copovidona, dióxido de titânio, hipromelose, polietilenoglicol 6000, polietilenoglicol 400 .... q.s.p. .....1 drágea.

**INFORMAÇÃO AO PACIENTE**
**Ação esperada do medicamento**
Redução dos sintomas decorrentes da estafa mental e/ou física.

**Cuidados de armazenamento**
Manter a embalagem fechada. Conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade.

**Prazo de validade**
24 meses a partir da data de fabricação. Atenção: Não utilizar o produto fora do prazo de validade impresso na embalagem. Após este prazo, o medicamento poderá perder gradativamente a eficácia, não se obtendo os resultados terapêuticos esperados.

**Gravidez e lactação**
Informar ao médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. Informar ao médico se está amamentando.

**Cuidados de administração**
Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

**Interrupção do tratamento**
Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

**Reações adversas**
Informar ao médico o aparecimento de reações desagradáveis.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**Ingestão concomitante com outras substâncias**
Não são conhecidas quaisquer restrições ao uso de **TAURARGIN** juntamente com alimentos.

**Contra-indicações e precauções**
Informar ao médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.
**TAURARGIN** é contra-indicado para pacientes com hipersensibilidade ao produto.

Atenção: Este medicamento contém açúcar (1,95 mg), portanto, deve ser usado com cautela em pacientes portadores de Diabetes.

**NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.**

**INFORMAÇÃO TÉCNICA**
**CARACTERÍSTICAS**
**TAURARGIN** reúne em associação de efeito convergente:
Aspartato de arginina, agente corretor de manifestações da fadiga muscular e da anóxia tissular, além de estimulante das glândulas supra-renais e do tecido intersticial da gônada masculina.
Taurina, componente dos ácidos biliares, desenvolve importante atividade na regulação do potencial da membrana de todas as células e, particularmente, da célula nervosa, das fibras musculares esqueléticas e miocárdicas, sob a influência da captação do potássio.
Aumenta, ainda, as propriedades solubilizantes do sangue, facilitando o transporte do oxigênio e dos elementos nutritivos e concorrendo para exaltar a ação farmacodinâmica dos outros componentes do medicamento sobre as células nervosas e musculares.
O fosfato de ditetraetilamônio atua por intermédio do fósforo e participa da composição dos fosfolipídios indispensáveis para a formação de proteínas de alto valor biológico, desenvolvendo, ainda, notável ação estimulante do metabolismo dos glicídios utilizados pelo organismo somente sob a forma de ésteres fosfóricos.
O radical tetraetilamônio estimula a função respiratória e a função circulatória, favorecendo a nutrição do sistema nervoso central.

**INDICAÇÕES**
Astenia física.
Astenia psíquica.
Ação bioenergética antifadiga.
Perturbações do sono.
Perturbações neuropsíquicas.
Alterações da capacidade intelectual.

**CONTRA-INDICAÇÕES**
**Hipersensibilidade ao produto.**

**PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS**
**Não são conhecidas até o presente momento.**

**INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**
**Não são conhecidas até o presente momento.**

**EFEITOS COLATERAIS**
**Ainda não são conhecidas a intensidade e freqüência dos efeitos colaterais.**

**POSOLOGIA**
Varia de acordo com o quadro clínico apresentado e com a orientação médica.
Em média: 4 a 6 drágeas por dia ou a critério médico.

**SUPERDOSAGEM**
**Na eventualidade de superdosagem, recomenda-se adotar as medidas habituais.**

**PACIENTES IDOSOS**
**TAURARGIN** pode ser usado por pessoas acima de 65 anos de idade.

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: Vide cartucho.

Reg. M.S. nº 1.0146.0037
Farmacêutica Responsável:
Dra. Maria Isilda Neves Torres - CRF-SP 14.820

**LABORATÓRIOS BALDACCI S.A.**
Rua Pedro de Toledo, 520 - São Paulo - SP
CNPJ 61.150.447/0001-31 - Indústria Brasileira

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**
lbaldacci@lbaldacci.com.br
✆ 0800-133 222