

TEXTO DE BULA DO PRODUTO TERAGRAN-M
Comprimidos revestidos

BRISTOL-MYERS SQUIBB

TERAGRAN-M

Polivitamínico

comprimidos revestidos

APRESENTAÇÕES

TERAGRAN-M é apresentado em embalagens contendo 30 comprimidos revestidos

USO ADULTO E CRIANÇAS ACIMA DE 12 ANOS

COMPOSIÇÃO

Componente	Quantidade por comprimido	% IDR*
Vitamina A (como acetato de retinol)	6976 UI	349%
Vitamina B ₁ (como mononitrato de tiamina)	9,2 mg	766%
Vitamina B ₂ (como riboflavina)	1,70 mg	131%
Vitamina B ₆ (como cloridrato de piridoxina)	4,11 mg	316%
Vitamina B ₁₂ (como cianocobalamina)	6,00 mcg	250%
Vitamina C (como ácido ascórbico)	65 mg	144%
Vitamina D ₃ (como colecalciferol)	400 UI	200%
Vitamina E (como acetato de tocoferol)	41 UI	273%
ácido pantotênico (como pantotenato de cálcio)	9,2 mg	184%
niacinamida (como nicotinamida)	20,2 mg	126%
cálcio ¹	106 mg	11%
cobre ²	1,00 mg	111%
ferro ³	15,0 mg	107%
iodo ⁴	0,12 mg	89%
magnésio ⁵	6,00 mg	2,31%
manganês ⁶	1,00 mg	43%
potássio ⁷	5,04 mg	-
zinco ⁸	1,5 mg	21%

* IDR: Ingestão Diária Recomendada para adultos

¹ Na forma de carbonato de cálcio e pantotenato de cálcio

² Na forma de sulfato cúprico

³ Na forma de fumarato ferroso

⁴ Na forma de iodeto de potássio

⁵ Na forma de óxido de magnésio

⁶ Na forma de sulfato de manganês

⁷ Na forma de sulfato de potássio

⁸ Na forma de sulfato de zinco

Ingredientes inativos: dióxido de silício, lactose, polivinilpirrolidona, crospovidona, ácido esteárico, estearato de magnésio, polietilenoglicol 400, hidroxipropilmetilcelulose, corante FD&C vermelho nº 40, corante FD&C azul nº 2, triacetina, dióxido de titânio.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento: **TERAGRAN-M** é formulado para prevenir as deficiências orgânicas de vitaminas e sais minerais em diversas situações.

Cuidados de armazenamento: Este medicamento deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 ° C e 30 ° C). Proteger da umidade.

Prazo de validade: vide cartucho. **Este medicamento não deverá ser utilizado caso o prazo de validade do produto esteja vencido.**

Gravidez e lactação: **TERAGRAN-M** é contra-indicado durante a gravidez. Informar sempre ao médico a ocorrência de gravidez, antes ou durante a vigência do tratamento.

Cuidados de administração: **TERAGRAN-M** deve ser ingerido com um pouco de água, leite ou suco de frutas.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DESCRIÇÃO

TERAGRAN-M comprimidos revestidos é uma associação de sais minerais e vitaminas essenciais adequadamente balanceadas para suprir as necessidades orgânicas.

INDICAÇÕES

TERAGRAN-M está indicado como suplemento vitamínico em dietas restritivas e inadequadas.
TERAGRAN-M está indicado como suplemento vitamínico em idosos.

CONTRA-INDICAÇÕES

TERAGRAN-M é contra-indicado durante a gravidez e em pacientes com hipersensibilidade a algum dos componentes da formulação.

POSOLOGIA

1 comprimido ao dia. Doses maiores somente por indicação médica.

CONSERVAÇÃO

Conservar o produto em temperatura ambiente (entre 15 ° C e 30 ° C). Proteger da umidade.

SUPERDOSAGEM

Em geral a superdosagem acidental ou proposital pode causar dor de cabeça, vômitos, ressecamento das mucosas, descamação, danos ao fígado, constipação, diminuição da absorção de alguns minerais. O consumo excessivo de Vitamina D pode causar hipercalcemia e hipercalcúria levando a depósito de cálcio nos tecidos e danos renais e cardiovasculares irreversíveis. A toxicidade aguda para zinco causa irritação gastrointestinal e vômitos. A superdosagem de ferro pode levar a intoxicação fatal quando ingerido em doses muito altas (acima de 200 mg/kg). Mantenha o produto longe do alcance de crianças, e, em caso de superdosagem acidental, consultar o médico imediatamente, ou um centro de intoxicação. Muitos dos sintomas somente serão observados somente em casos de superdosagem crônica, portanto siga corretamente o modo de usar.

ATENÇÃO: SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

nº do lote, data de fabricação e data de validade: vide cartucho.



Reg. MS-1.0180.0080

Farm. Bioq. Resp.:
Dra. Tathiane Aoqui de Souza.
CRF-SP nº 26.655

BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA S.A.
Av. Carlos Gomes, 924 - Santo Amaro - São Paulo - SP
CNPJ 56.998.982/0001-07 - Indústria Brasileira

15/01/08