

Thiabena[®]

tiabendazol



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

THIABENA[®] POMADA DERMATOLÓGICA: cartucho contendo 1 bisnaga com 45g.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO TÓPICO

COMPOSIÇÃO

tiabendazol 50 mg

Excipientes* q.s.p. 1 g

* (macrogol, propilenoglicol, essência de alfazema)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

ACÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO

THIABENA[®] tem atividade anti-helmíntica contra nematódios.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Conserve o produto na embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e umidade.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação (vide cartucho). Não use medicamentos com prazo de validade vencido.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao médico se está amamentando.

CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

REAÇÕES ADVERSAS

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, como: irritação, ardor, maceração e descamação da pele.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES

O produto não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

O tiabendazol, um derivado benzimidazólico, é um agente anti-helmíntico com atividade contra nematóides, atua contra muitos estágios larvais e ovos. O mecanismo de ação não é conhecido, mas

o tiabendazol pode inibir o sistema fumarato-redutase interferindo, desta maneira, com a fonte de energia.

INDICAÇÕES

Agente antiparasitário indicado para o tratamento de escabiose e *Larva migrans* cutânea. Tiabendazol tópico tem demonstrado ser eficaz no tratamento de micoses superficiais produzidas por dermatófitos comuns.

CONTRAINDICAÇÕES

Não deve ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Gerais: o produto não deve ser aplicado nos olhos e mucosas.

Interromper o uso se ocorrer sensibilização ou irritação da pele.

Gravidez e amamentação: Embora não tenha sido relatado problemas em mulheres grávidas, este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Pediatria: Estudos clínicos para a avaliação dos efeitos tópicos do tiabendazol em pacientes pediátricos ainda não foram estabelecidos.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Gerais: o produto não deve ser aplicado nos olhos e mucosas.

Interromper o uso se ocorrer sensibilização ou irritação da pele.

Gravidez e amamentação: Embora não tenha sido relatado problemas em mulheres grávidas, este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Pediatria: Estudos clínicos para a avaliação dos efeitos tópicos do tiabendazol em pacientes pediátricos ainda não foram estabelecidos.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações medicamentosas.

INTERFERÊNCIA EM EXAMES LABORATORIAIS

Não são conhecidas interferências em exames laboratoriais.

REAÇÕES ADVERSAS/COLATERAIS

Mais frequente: irritação, ardor, maceração e descamação da pele.

POSOLOGIA

Tratamento da escabiose:

À noite, tomar banho quente de não menos que 10 minutos de duração. Em seguida secar rapidamente a pele e aplicar a pomada sobre as zonas lesadas e áreas vizinhas, friccionando suavemente.

Na manhã seguinte, tomar outro banho e aplicar novamente a pomada. Repetir a operação 5 dias seguintes. Durante o tratamento, ferver as roupas utilizadas e de cama, antes de lavar.

Tratar simultaneamente todos os membros doentes da família.

Caso necessário, o tratamento poderá ser continuado por mais 5 dias seguidos.

Tratamento da “*Larva migrans*”:

Friccionar a pomada durante 5 dias, 3 vezes ao dia, na extremidade ativa das trilhas ou túneis escavados pelo parasita. Repetir o tratamento por 3 a 5 dias seguidos.

Tratamento das Dermatomicoses:

Friccionar a pomada sobre as áreas afetadas, 2 vezes ao dia.

Manter no mínimo até o desaparecimento das lesões.

SUPERDOSAGEM

Uso exclusivamente tópico. Na eventualidade da ingestão acidental, recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.

PACIENTES IDOSOS

Não houve diferenças significativas na eficácia ou segurança de THIABENA® relacionadas com a idade. Entretanto, foi observada maior sensibilidade ao medicamento em alguns pacientes idosos.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS,
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

Lote, Fabricação e Validade: Vide Cartucho.

Farmacêutico Responsável: Dr. Claudio Roberto Mataruco.
CRF-SP nº 47.156

Registro MS nº 1.0550.0181

UCI-FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
Rua do Cruzeiro, 374 – São Bernardo do Campo – SP
CNPJ 48.396.378/0001-82 – Indústria Brasileira