



TIADOL[®]

tiabendazol



FORMAS FARMACÊUTICAS, VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÕES

Pomada dermatológica: embalagem contendo uma bisnaga com 20 g.

Sabonete: embalagem contendo um sabonete com 65 g.

USO TÓPICO

USO ADULTO OU PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada grama de pomada dermatológica contém:

tiabendazol	50 mg
excipiente q.s.p.	1 g

(propilenoglicol, trolamina, metilparabeno, ácido láctico, álcool cetostearyllico, petrolato líquido, polissorbito 60, acetato de cetila, glicerol, álcool de lanolina acetilado, fenoxietanol, butilparabeno, etilparabeno, propilparabeno, edetato dissódico e água).

Cada grama do sabonete contém:

tiabendazol	50 mg
excipiente q.s.p.	1 g

(sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, edetato dissódico, ácido etidrônico, essência de Egeu IV, pigmento vermelho ácido 88 CI 15620, cloreto de sódio, glicerol e dióxido de titânio).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- O tiabendazol é um agente anti-helmíntico tópico.
 - Conservar o TIADOL[®] pomada e sabonete em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), proteger da luz e umidade.
 - O prazo de validade é 36 meses a contar da data de sua fabricação.
 - **Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.**
 - Tanto a administração quanto a suspensão do uso do medicamento deverão ser feitas sob orientação médica.
 - Este medicamento só deve ser utilizado localmente, conforme indicação médica.
 - Informe seu médico a ocorrência de gravidez, durante ou após o tratamento, pois o tiabendazol não deve ser utilizado durante a gravidez ou lactação.
- TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**
- NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.**

Para acompanhar o tratamento deve-se adotar as seguintes normas de higiene

- Manter limpas as instalações sanitárias;
- Ferver roupas de cama, íntimas e toalhas;
- Lavar as mãos das crianças antes das refeições e após usar os sanitários;
- Cortar e escovar sempre as unhas das crianças;
- Evitar que as crianças andem descalças;
- Lavar com água fervida ou filtrada, verduras, legumes e frutas antes de comê-los;
- Manter sempre tampados depósitos de água e alimentos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O tiabendazol é um derivado benzimidazólico, é um agente anti-helmíntico que julga-se atuar inibindo a fumarato redutase específica dos helmintos. É quimioterápico de eleição para o tratamento da *larva migrans* cutânea (*Ancylostoma brasiliense*).

O tratamento tópico com a pomada de tiabendazol é muito mais superior no tratamento da *larva migrans* do que métodos antigos.

INDICAÇÕES

O tiabendazol é indicado para tratamento tópico de escabiose e *larva migrans* cutânea. Também tem demonstrado eficácia no tratamento de micoses superficiais produzidas por dermatófitos comuns.

CONTRAINDICAÇÕES

O tiabendazol é contraindicado para pacientes com história de hipersensibilidade ou a outro derivado benzimidazólico.

Seu uso também é contraindicado no período de gravidez e lactação.

PRECAUÇÕES

O tratamento com tiabendazol deve ser descontinuado imediatamente a manifestações alérgicas de





hipersensibilidade.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO

O tiabendazol tem sido relatado como teratogênico em ratos e camundongos.

Embora a toxicidade durante a gravidez seja desconhecida, recomenda-se que o tiabendazol seja usado somente quando não houver alternativa adequada, é recomendável não usar tiabendazol durante a gravidez e lactação.

Pacientes idosos: Estudos apropriados relacionando a idade com os efeitos do uso de tiabendazol tópico não foram realizados com uma população geriátrica. Porém nenhum problema específico relacionado com a idade foi relatado até hoje.

ADVERTÊNCIA

O tiabendazol pomada ou sabonete são formas farmacêuticas para uso tópico, no caso de ingestão acidental, induzir a vômito ou realizar lavagem gástrica, como não existe antídoto específico, medidas sintomatológicas e de suporte devem ser empregadas.

REAÇÕES ADVERSAS

Irritação, ardor, maceração e descamação da pele.

POSOLOGIA

Sabonete

O sabonete de tiabendazol deverá ser usado como complemento do tratamento.

Lavar o local afetado, e deixar secar a espuma, depois lavar com água e secar. A seguir, aplicar a pomada de tiabendazol, conforme a indicação.

Pomada

Tratamento de escabiose

A noite, tomar banho quente de não menos de 10 minutos de duração. Em seguida secar rapidamente a pele e aplicar a pomada sobre as zonas afetadas e áreas vizinhas, friccionando suavemente. Na manhã seguinte, tomar outro banho e aplicar novamente a pomada.

Repetir durante 5 dias seguidos.

Durante o tratamento ferver a roupa usada e de cama, antes de lavar. Tratar simultaneamente todos os membros doentes da família. Caso necessário repetir o tratamento por mais 5 dias.

Tratamento de larva migrans

Friccionar a pomada durante 5 dias, três vezes ao dia, na extremidade ativa das trilhas ou túneis escavados pelo parasita, repetir o tratamento por 3 a 5 dias seguidos.

Tratamento das dermatomicoses

Friccionar a pomada sobre as áreas afetadas, duas vezes ao dia. Manter o tratamento, no mínimo até o desaparecimento das lesões.

SUPERDOSAGEM

Com o uso tópico não há risco de superdose. Porém em casos de ingestão acidental de grandes quantidades do medicamento, caso necessário, deve-se utilizar um método apropriado de esvaziamento gástrico.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

® Marca Registrada

Reg. MS nº 1.0577.0126

Número do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho

Farm. Resp.: Dr. Marcelo Ramos - CRF-SP nº 16.440

Registrado por:

Bunker Indústria Farmacêutica Ltda.

Rua Anibal dos Anjos Carvalho, 212 - São Paulo - SP

C.N.P.J. 47.100.862/0001-50 - Indústria Brasileira

Para a forma farmacêutica sabonete:

Fabricado por:

Indústria e Comércio Zambon Bernardi Ltda.

Rua Toledo Barbosa, 666-690 - São Paulo- SP



BUNKER

BK03018

