

Vagitrene®

Extrato Aquoso de
Triticum vulgare

Medicamento fitoterápico

FORMA FARMACÊUTICA, APRESENTAÇÃO E COMPOSIÇÃO

Creme Vaginal.

Embalagem contendo 1 bisnaga com 40 g + 10 aplicadores descartáveis com capacidade para 4g.

USO ADULTO

Composição

Cada 4g contém:

Extrato aquoso de *Triticum vulgare* 600 mg

Veículos q.s.p. 4g

Veículos: cloreto de benzalcônio, sorbitol, vaselina sólida, propilenoglicol, álcoois graxos etoxilados, fosfato dissódico, metilparabeno, propilparabeno e água deionizada.

DESCRIÇÃO BOTÂNICA:

Nomenclatura botânica oficial: *Triticum aestivum* (vulgare)

Família: *L. Graminaceae*

Parte da planta: *Planta inteira (sementes, folhas e raízes)*

Gênero: *Trigo*

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO

Vagitrene® é um medicamento fitoterápico que possui ação sobre lesões que necessitem da ativação dos processos de reepitelização do colo uterino. Na pós-diatermocoagulação. No tratamento adjuvante das cervicites.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser conservado em local fresco, protegido da luz e umidade.

PRAZO DE VALIDADE

Desde de que observados, os devidos cuidados de conservação, o prazo de validade de Vagitrene® é de 24 meses, contados a partir da data de fabricação impressa em sua embalagem externa.

NUNCA USE MEDICAMENTOS COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. PODE SER PREJUDICIAL À SUA SAÚDE.

GRAVIDEZ E LACTAÇÃO

Informe seu médico ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando.

CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO

Siga a orientação do seu médico, respeitando

sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

REAÇÕES ADVERSAS

Informe seu médico ao aparecimento de reações desagradáveis.

CONTRA-INDICAÇÕES

É CONTRA-INDICADO EM PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE À QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA. INFORME SEU MÉDICO SOBRE QUALQUER MEDICAMENTO QUE ESTEJA USANDO, ANTES DO INÍCIO, OU DURANTE O TRATAMENTO.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS

Vagitrene® contém extrato aquoso de *Triticum vulgare*, um potente ativador da regeneração tecidual.

O uso de Vagitrene® em processos agudos e

crônicos exclui a possibilidade de efeitos tóxicos. Vagitrene® apresenta atividade bacteriostática.

INDICAÇÕES

Todas as lesões que necessitam da ativação dos processos de reepitelização do colo uterino. Na pós-diatermocoagulação. No tratamento adjuvante das cervicites.

CONTRA-INDICAÇÕES

HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

NÃO DEVE SER USADO POR TEMPO PROLONGADO, PODE FAVORECER O CRESCIMENTO BACTERIANO DE CEPAS RESISTENTES.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

NÃO EXISTEM EVIDÊNCIAS CLINICAMENTE RELEVANTES.

REAÇÕES ADVERSAS

AINDA NÃO SÃO CONHECIDAS A INTENSIDADE E FREQUÊNCIA DAS REAÇÕES ADVERSAS.

SUPERDOSAGEM

Não foram relatados casos de superdosagem.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade:

VIDE CARTUCHO.

Para sua segurança mantenha esta embalagem até o uso total do medicamento.

MS - 1.0043.0658

Farm. Resp.:

Dra. Sônia Albano Badaró - CRF-SP 19.258



EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA.

Av. Ver. José Diniz, 3.465

São Paulo - SP

CNPJ 61.190.096/0001-92

Indústria Brasileira




Eurofarma
0800-704-3876

euroatende@eurofarma.com.br
www.eurofarma.com.br


POSOLOGIA E INSTRUÇÕES PARA USO:

1. Para sua segurança, esta bisnaga está hermeticamente lacrada. Esta embalagem não requer o uso de objetos cortantes.

2. Retire a tampa da bisnaga (fig. 1).




3. Com a parte pontiaguda superior da tampa perfure o lacre da bisnaga (fig. 2).



4. Encaixe o aplicador na bisnaga (fig. 3).

5. Mantendo o conjunto em posição vertical, aperte a base da bisnaga até que o êmbolo tenha saído completamente (fig. 4).



6. Retire o aplicador e feche novamente a bisnaga.

7. Introduza profundamente no canal vaginal um aplicador cheio (4g) ao dia, durante 10 dias consecutivos. Nos casos mais graves (cauterizações mais extensas), 2 aplicações ao dia, por 10 dias consecutivos.