

Leia com atenção antes de usar o produto.

VENALOT[®] H

cumarina, heparina sódica

Forma farmacêutica, apresentação e via de administração

Creme. Frascos com 80 e 120 ml. Uso tópico.

USO ADULTO OU PEDIÁTRICO

Composição

Cada ml do creme contém:

Cumarina	5 mg
Heparina sódica	50 UI
Excipiente q.s.p.	1 ml

Excipientes: ácido cítrico, ácido sórbico, etilparabeno, butilhidroxianisol, oleato de isodecila, álcool cetosteárilico, óleo de mamona etoxilado, cetoesteril sulfato de sódio, glicerina, (etil, propil) 4- hidroxibenzoato, óleo de oliva, essência, , água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento

Melhora da circulação periférica venosa e linfática, diminuindo também o inchaço decorrente de problemas dos vasos linfáticos e venosos.

Cuidados de armazenamento

Conserve o produto na embalagem original e à temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Prazo de validade

O prazo de validade está impresso na embalagem do produto. Não use medicamento com o prazo de validade vencido, pois, além de não obter o efeito desejado, você estará prejudicando sua saúde.

Gravidez e lactação

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento. Informe ao médico se estiver amamentando.

Cuidados de administração

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. O produto não deve ser aplicado na mucosa ou próximo a ela, para evitar irritação local e absorção excessiva.

Interrupção do tratamento

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Reações adversas

Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis tais como vermelhidão e alergias da pele.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Utilização concomitante com outras substâncias

Não existem restrições quanto a ingestão de alimentos e bebidas durante o tratamento com Venalot® H.

Contra-indicações e precauções

O produto não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula. Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

Riscos da automedicação: NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características

Venalot® H creme pode ser usado em casos de doenças com distúrbios nas funções vasculares periféricas venosas e linfáticas, ocorrências de estase venosa e linfática associada a inflamações, rubor, dor e edemas. Venalot® H contém substâncias ativas que inibem a formação de edemas inflamatórios locais, promovendo a diminuição dos edemas e cicatrização após lesões e cirurgias. Acelera a regeneração dos capilares no tecido lesado e melhora a circulação da rede capilar, protegendo as paredes vasculares contra lesões e aumentando o fluxo sanguíneo. Além disso, provoca a dissolução de espasmos nos vasos e seus segmentos, fazendo com que a circulação sanguínea e linfática se normalize. A rápida absorção da substância ativa pela pele e sua distribuição ao sistema vascular deve ser especialmente ressaltada.

Indicações

Tratamento local de afecções venosas e linfáticas: síndrome varicosa, varizes, hemorroidas, úlceras da perna, flebites, tromboflebites, periflebitas, síndrome pós-flebítica, linfangites.

Infiltrações inflamatórias, hematomas e demais seqüelas de contusão e entorses.

Distúrbios circulatórios locais, afecções articulares inflamatórias.

Tratamento auxiliar nos casos mais graves de afecções venosas e linfáticas, como, por exemplo, linfedemas.

Contra-indicações

Não deve ser usado em lesões abertas (solução de continuidade) ou em pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.

Precauções

Não aplicar sobre a mucosa ou próximo a ela, para evitar irritação local ou absorção em excesso dos princípios ativos. As enzimas hepáticas devem ser monitoradas em tratamentos de longa duração.

Interações medicamentosas

Até o momento não foram relatados casos de interação medicamentosa com o uso do produto.

Reações adversas

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas.

Ainda não foram relatadas reações adversas com o uso do produto.

Posologia e modo de usar

Aplicar 2 ou 3 vezes ao dia fina camada na região afetada, fazendo leve massagem.

Aguardar absorção completa do creme. Eventualmente, a critério médico, tratamento combinado com Venalot® drágeas.

Superdose

Na eventualidade da ingestão acidental, recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.

Pacientes idosos

Não há restrições ou recomendações especiais com relação ao uso do produto por pacientes idosos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

MS - 1.0639.0118

Farmacêutico Responsável: Wagner Moi – CRF-SP 14.828

N.º do lote, data da fabricação e data da validade: vide cartucho.

EM CASO DE DÚVIDAS LIGUE GRATUITAMENTE

SAC: 0800-7710345

www.nycomed.com.br

Fórmula original de

Schaper & Brümmer

Alemanha

Nycomed Pharma Ltda.

Rodovia SP 340 S/N, Km 133,5

Jaguariúna - SP

CNPJ 60.397.775/0008-40

Indústria Brasileira

VHCR_0702_0208