

Venoruton®

o-(β-hidroxietil)-rutosídeos

Forma farmacêutica e apresentações:

Comprimidos. Embalagem contendo 20 comprimidos.

Cápsulas. Embalagem contendo 20 cápsulas.

Gel. Bisnaga contendo 20 g.

USO PEDIÁTRICO E ADULTO

Composição:

Cada comprimido de Venoruton® contém 500 mg de o-(β-hidroxietil)-rutosídeos.

Excipientes: polietilenoglicol 6000 e estearato de magnésio.

Cada cápsula de Venoruton® contém 300 mg de o-(β-hidroxietil)-rutosídeos.

Excipientes: polietilenoglicol 6000, óxido de ferro amarelo, dióxido de titânio e gelatina.

Cada g de gel de Venoruton® contém 20 mg de o-(β-hidroxietil)-rutosídeos.

Excipientes: carbômero, hidróxido de sódio, EDTA dissódico, cloreto de benzalcônio e água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Leia a bula atentamente antes de começar a usar este medicamento. Se após a leitura você ainda tiver alguma dúvida consulte um médico.

Para que Venoruton® é utilizado?

Venoruton® é utilizado nas dores e edemas relacionados com a insuficiência venosa ou de origem traumática, proporcionando a redução das varizes.

Quais os cuidados de armazenamento de Venoruton®?

Venoruton® comprimidos e cápsulas devem ser mantidos em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C) e protegidos da umidade. Venoruton® gel deve ser mantido à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

Qual o prazo de validade de Venoruton®?

O prazo de validade está impresso no cartucho. Não utilize o produto após a data de validade.

Eu posso usar Venoruton® se eu estiver grávida ou amamentando?

Venoruton® pode ser usado após o terceiro mês de gravidez e durante a lactação, desde que haja acompanhamento médico.

Como utilizar Venoruton® corretamente?

Os comprimidos e as cápsulas devem ser ingeridos durante ou imediatamente após as refeições.

Venoruton cápsulas 300 mg: tomar 2 cápsulas de Venoruton® ao dia. As cápsulas devem ser ingeridas com um pouco de líquido, sem que sejam mastigadas, pela manhã, ou pela manhã e à noite.

Venoruton® comprimidos 500 mg: inicialmente, tomar 2 comprimidos ao dia. Para o tratamento de manutenção tomar 1 comprimido ao dia.

Venoruton gel: Aplicar o gel duas vezes por dia (de manhã e à tarde), massageando ligeiramente para facilitar a penetração do medicamento, até completa absorção, isto é, até que a pele pareça estar seca, e não se sinta o gel ao contato da mão.

Em caso de ferimentos abertos, não aplicar o produto sobre a lesão, mas ao redor dela.

O que fazer se uma dose for esquecida?

Se você se esquecer de tomar uma dose, espere até o horário de tomar a sua próxima dose.

Quais são os efeitos indesejáveis que Venoruton® pode causar?

Em casos muito raros foram relatadas reações alérgicas da pele, distúrbios leves do estômago e intestino, dores de cabeça e vermelhidão da face, que desaparecem rapidamente após a interrupção do tratamento. Caso ocorra qualquer reação desagradável, consulte um médico.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Eu posso tomar Venoruton® se eu estiver tomando algum outro medicamento?

Em caso de dúvida, consulte um médico sobre quais medicamentos você pode estar utilizando concomitantemente a Venoruton®.

Quando Venoruton® não deve ser usado?

Não use Venoruton® se você for alérgico a qualquer componente do produto (veja os ingredientes no item "composição").


SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

DICAS PARA O PACIENTE

Como surgem as varizes?

Pelas veias, o sangue "consumido" é bombeado de volta ao coração. Este mecanismo de eliminação pode sofrer interferências por diversas causas. Deficiências do tecido conjuntivo condicionadas à hereditariedade ou outros agravos (por exemplo: gravidez, ato de sentar-se ou estar de pé por muito tempo) superdilatam as paredes venosas. As válvulas venosas que funcionam como pequenas válvulas não se fecham mais por completo. O sangue se congestiona nas pernas, gerando acúmulos de água no tecido que envolve o local (edema). As pernas começam a inchar, engrossam, tornam-se cansadas e pesadas, provocando dores, formigamento ou sensações de tensão nas pernas.





Exercícios

Exercícios regulares de relaxamento para as pernas e os pés previnem as complicações das veias: gire os pés em círculo ou "acelere" alternadamente para a direita e esquerda, como se estivesse dirigindo um carro.

Nada de sobrecarga desnecessária para as suas pernas

As suas pernas não se sobrecarregam somente ao estar sentado ou ficar de pé por muito tempo. Os calçados "errados" ou o ato de carregar peso também podem desgastar intensamente as veias.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Venoruton® é um medicamento que tem em sua composição um bioflavonóide chamado rutosídeo, que atua principalmente nos capilares venulares, reduzindo a permeabilidade microvascular, diminuindo edemas pós-traumáticos, pós-cirúrgicos, varizes, inflamação e dor. **Venoruton®** inibe as prostaglandinas- E_2 (ação anti-inflamatória), age na circulação sanguínea protegendo a deformidade dos glóbulos vermelhos, reduz a agregação plaquetária e protege o epitélio vascular.

Indicações

Venoruton® comprimidos e cápsulas: estado pré-varicoso. Dores e edemas das varizes declaradas. Varizes e hemorroidas gravídicas. Complicações das varizes: tromboflebitis superficiais, estado pós-flebitico. Transtornos tróficos, úlceras varicosas e dermatite varicosa. Coadjuvante do tratamento esclerosante e da exêrese das varizes. Varizes anorretais (hemorroidas) e suas complicações. Parestesias: formigamento das extremidades à noite e ao despertar, câimbras noturnas. **Venoruton® gel:** dores e edemas relacionados à insuficiência venosa; dores após escleroterapia venosa. Dores e edemas de origem traumática; distensões; contusões musculares.

Contra-indicações

Venoruton® é contra-indicado nos casos de hipersensibilidade à qualquer componente da formulação.

Precauções

Em caso de reações de hipersensibilidade, deve-se interromper o tratamento e procurar orientação médica.

Gravidez e lactação

Embora estudos correspondentes não tenham resultado em quaisquer indicações de lesão do feto, não se recomenda o emprego de **Venoruton®** nos três primeiros meses de gravidez; após este período, **Venoruton®** deve ser usado com acompanhamento médico. **Venoruton®** pode ser ingerido durante o período de aleitamento, pois os vestígios da substância ativa encontrados no leite materno, em experimentos em animais, não são significativos.

Interações Medicamentosas

Venoruton® não apresenta qualquer interação com outras drogas ou alimentos; também não mostra qualquer efeito alternado com medicamentos inibidores da coagulação do tipo cumarina. Não se deve ingerir álcool concomitantemente à ingestão de qualquer tipo de medicamento.

Reações adversas

Em casos muito raros foram relatadas reações adversas leves (reações alérgicas da pele, distúrbios leves do estômago e intestino, dores de cabeça, vermelhidão da face) que desaparecem rapidamente após interrupção do tratamento.

Posologia

Venoruton® cápsulas 300 mg: no início do tratamento, 1 cápsula 2 vezes ao dia. As cápsulas devem ser ingeridas com um pouco de líquido, sem que sejam mastigadas, pela manhã e à noite, durante ou imediatamente após as refeições. Em alguns casos, são úteis e necessárias doses diárias superiores a 900 mg.

Venoruton® comprimidos 500 mg: no início do tratamento, em casos de doenças venosas, tomar 2 comprimidos ao dia. Após 4 semanas, o tratamento poderá ser prosseguido com 1 comprimido diariamente (terapia de manutenção). **Venoruton® gel:** Aplicar o gel duas vezes por dia (de manhã e à tarde), friccionando ligeiramente para facilitar a penetração do medicamento, até completa absorção, isto é, até que a pele pareça estar seca, e não se sinta o gel ao contato da mão. Em caso de úlceras, não aplicar o produto sobre a lesão, mas ao redor dela.

A duração do tratamento depende das complicações. Basicamente, não existe um limite temporal para a duração do tratamento. Persistindo as dores, após orientação médica o tratamento deverá ser prosseguido por um período mais longo.

Superdosagem

Não foram relatados casos de superdosagem com **Venoruton®**.

PACIENTES IDOSOS

Venoruton® pode ser utilizado por pacientes idosos desde que verificadas as contra-indicações e precauções descritas acima.

Lot, data, de fabricação e de validade: vide cartucho

Venoruton® gel: fabricado por: Novartis Consumer Health S.A. – Nyon, Suíça. Importado e distribuído por: Novartis Biociências S.A.

Venoruton® comprimidos e cápsulas: fabricado e distribuído por: Novartis Biociências S.A. Av. Ibirama, 518 - Complexos 441/3 - Taboão da Serra - SP
CNPJ: 56.994.502/0098-62 - Indústria Brasileira

Farm. Resp.: Marco A. J. Siqueira - CRF- SP 23.873
Reg. MS - 1.0068.0870

® = Marca registrada de Novartis AG, Basileia, Suíça.

Fabricado de acordo com o processo original de Novartis AG, Suíça; resultante da fusão de Ciba-Geigy e Sandoz.

