
Ácido fusídico + Valerato de betametasona**Antibiótico/antiinflamatório tópico****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO****Nome do Produto:** Verutex B**Nome Genérico:** Ácido fusídico + Valerato de betametasona**Forma farmacêutica e apresentações**

Creme – bisnagas de 5 e 15 gramas.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO**Composição**

Cada 1 grama de Verutex B (Ácido fusídico + Valerato de betametasona) creme contém: 20 mg de ácido fusídico e 1,0 mg de valerato de betametasona.

Ingredientes ativos: Ácido fusídico e valerato de betametasona

Excipientes: Cetomacrogol 1000, álcool cetosteárico, clorocresol, fosfato diidrogenado de sódio, parafina líquida, parafina branca leve, hidróxido de sódio e água purificada.

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

Solicitamos a gentileza de ler cuidadosamente as informações abaixo. Caso não esteja seguro a respeito de determinado item, favor informar ao seu médico.

O Verutex B (Ácido fusídico + Valerato de betametasona) só deve ser usado quando receitado por um médico. O creme pode ser aplicado diretamente sobre a lesão da pele utilizando-se a extremidade de um dos dedos. Deve ser aplicado em camada fina. Nunca aplique perto dos olhos.

Ação esperada do medicamento

Verutex B (Ácido fusídico + Valerato de betametasona) contém em sua fórmula uma substância que age na pele, o ácido fusídico, pertencente ao grupo de medicamentos chamados de antiinfeciosos de uso externo, sendo capaz de combater doenças infecciosas da pele, associado a um esteróide, o valerato de betametasona (*este esteróide não deve ser confundido com esteróides anabolizantes usados imprópriamente por alguns fisicultores*). Verutex B (Ácido fusídico + Valerato de betametasona) age reduzindo o edema (inchaço), urticária e vermelhidão como também eliminando a bactéria causadora da infecção da pele.

Cuidados de armazenamento

Verutex B (Ácido fusídico + Valerato de betametasona) deve ser conservado em temperatura ambiente.

Prazo de validade

Este medicamento possui prazo de validade a partir da data de fabricação (vide embalagem externa do produto). Não tome o medicamento após a data de validade indicada na embalagem; pode ser prejudicial à saúde.

Gravidez e lactação

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. Informar ao médico se está amamentando. Você não deverá amamentar durante o tratamento com Verutex B (Ácido fusídico + Valerato de betametasona).

Cuidados de administração

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

O creme pode ser aplicado diretamente sobre a lesão da pele utilizando-se a extremidade de um dos dedos. Deve ser aplicado em camada fina. Nunca aplique perto dos olhos.

Interrupção do tratamento

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

Reações adversas

Informe o seu médico sobre o aparecimento de reações desagradáveis.

Caso surjam coceira, vermelhidão ou outros sinais de irritação após o uso do medicamento, suspenda seu uso e informe imediatamente a seu médico.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Contra-indicações e precauções

Você não deverá usar se for alérgico ao Verutex B (Ácido fusídico + Valerato de betametasona) ou a qualquer substância contida no creme.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

O Verutex B (Ácido fusídico + Valerato de betametasona) não deve ser utilizado para tratar condições de pele causadas somente por bactérias, isto é, manchas e bolhas; por vírus, ou seja, catapora/varicela e herpes simples; e por fungos, por exemplo, pé-de-atleta. Tampouco deve ser utilizado para tratar acne, rosácea ou um tipo de dermatite com manchas em torno da boca e queixo.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Características químicas e farmacológicas

O Verutex B (Ácido fusídico + Valerato de betametasona) combina a ação antibacteriana do ácido fusídico, que atua de forma eficaz contra o estafilococo, inclusive sobre cepas resistentes à penicilina, e o estreptococo; com o efeito antiinflamatório e antipruriginoso de um esteróide de mediana potência, como o valerato de betametasona.

Indicações

O Verutex B (Ácido fusídico + Valerato de betametasona) está indicado no tratamento das dermatoses inflamatórias, nas quais existe ou possa existir uma infecção bacteriana, como: eczema atópico, eczema discóide, eczema por estase, dermatite seborréica, dermatite de contato, líquen simples crônico e picadas de insetos.

Contra-indicações

O Verutex B (Ácido fusídico + Valerato de betametasona) está contra-indicado em infecções cutâneas causadas somente por bactérias, por vírus ou por fungos e em pacientes com reconhecida reação de hipersensibilidade aos componentes ativos da fórmula.

Precauções e advertências

Deve-se evitar o contato do Verutex B (Ácido fusídico + Valerato de betametasona) com os olhos, pois pode provocar irritação conjuntival.

Gravidez e lactação

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. Informar ao médico se está amamentando. Você não deverá amamentar durante o tratamento com Verutex B (Ácido fusídico + Valerato de betametasona).

Interações medicamentosas

Desconhecidas até o momento.

Reações adversas

Ainda não são conhecidas a intensidade e frequência das reações adversas. Em pacientes hipersensíveis é possível o aparecimento de irritação transitória (eritema e prurido).

Posologia

O Verutex B (Ácido fusídico + Valerato de betametasona) deve ser aplicado sobre a área afetada, 2 a 3 vezes ao dia.

Seu médico prescreveu Verutex B (Ácido fusídico + Valerato de betametasona) para sua condição individual de pele. O creme é usado para tratar condições de pele inflamada e dependendo do estado individual, a frequência e dosagem poderão ser alteradas.

Superdosagem

Ainda não foi descrita superdosagem com este medicamento.

Pacientes idosos

A critério médico, dependendo do estado individual, a frequência e dosagem poderão ser alteradas.

ESTE PRODUTO É UM NOVO MEDICAMENTO E EMBORA AS PESQUISAS TENHAM INDICADO EFICÁCIA E SEGURANÇA, QUANDO CORRETAMENTE INDICADO, PODEM OCORRER REAÇÕES ADVERSAS IMPREVISÍVEIS, AINDA NÃO DESCRITAS OU CONHECIDAS. EM CASO DE SUSPEITA DE REAÇÃO ADVERSA, O MÉDICO RESPONSÁVEL DEVE SER NOTIFICADO.

Registro MS-1.0100.0568

Farmacêutico responsável: Guilherme Neves Ferreira - CRF-RJ Cart. nº 4288

Fabricado sob licença de:

**F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basiléia, Suíça por
LEO Laboratories Limited, Irlanda**

Distribuído no Brasil por:

Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.

Estrada dos Bandeirantes, 2020 CEP 22710-104 - Rio de Janeiro /RJ

CNPJ 33.009.945/0023-39

Serviço Gratuito de Informações – 0800 7720 289

www.roche.com.br

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Nº do lote, data de fabricação, prazo de validade: vide cartucho.

Verutex B (Ácido fusídico + Valerato de betametasona)

Registro de Nova Associação no País

JAN/2002

LEO