



as reações mais frequentes são a hipotensão (queda da pressão arterial) e a sonolência.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTES MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Os sintomas da superdosagem de VIBRAZIN são hipotensão (queda de pressão arterial) e sonolência. Não existe antídoto específico. O tratamento usual da superdosagem aguda é a provocação do vômito, o mais precocemente possível, a não ser que o paciente esteja inconsciente. No hospital, a lavagem gástrica somente é útil se aplicada precocemente, devido à rápida absorção intestinal da dropropizina.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento deve ser conservado em sua embalagem original em temperatura ambiente (entre 15 e 30° C) e protegido da luz.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Reg. MS nº 1.0440.0158

Número do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho

Farm. Resp.: Dra. Priscila Gomes de Paula - CRF-SP nº 32.498

Instituto Terapêutico Delta Ltda.

Estrada do Capovilla, 129

Distrito Industrial - Indaiatuba - SP

C.N.P.J. 33.173.097/0002-74 - Indústria Brasileira



VIBRAZIN

dropropizina



FORMAS FARMACÊUTICAS, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÕES

Xarope adulto: embalagem contendo um frasco com 120 mL e um copo dosador.

Xarope pediátrico: embalagem contendo um frasco com 120 mL e um copo dosador.

Solução oral (gotas): embalagem contendo um frasco com 10 mL.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

COMPOSIÇÃO

Cada mL de xarope adulto contém:

dropropizina 3 mg
veículo q.s.p. 1 mL
(benzoato de sódio, ácido cítrico, ácido benzoico, corante vermelho ponceau, aroma de framboesa, sacarose e água).

Cada mL de xarope pediátrico contém:

dropropizina 1,5 mg
veículo q.s.p. 1 mL
(benzoato de sódio, ácido benzoico, corante vermelho ponceau, aroma de framboesa, sacarose e água).

Cada mL de solução oral (gotas) contém:

dropropizina 30 mg
veículo q.s.p. 1 mL
(benzoato de sódio, ácido benzoico, ácido cítrico, corante vermelho ponceau, aroma de framboesa, sacarose e água).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

VIBRAZIN é um medicamento contra a tosse, que age bloqueando os receptores da tosse. Apresenta uma discreta ação antialérgica, podendo ser usado no tratamento da tosse associada a condição alérgica.

A dropropizina é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal, com início de ação entre 15 a 30 minutos após a sua administração por via oral (por boca).

PORQUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

VIBRAZIN está indicado para o tratamento dos sintomas da tosse irritante e seca (sem secreção).

DE13744



QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

CONTRAINDICAÇÕES

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE.

VIBRAZIN é contraindicado em indivíduos que apresentam alergia à dropropizina, insuficiência respiratória grave, hipotensão (queda da pressão arterial), em pacientes asmáticos e em crianças com menos de 2 anos de idade. Não deve ser usado em casos de tosse produtiva (com secreção).

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

O tratamento com VIBRAZIN deve ter a duração mais curta possível, geralmente poucos dias. Se os sintomas persistirem, você deverá procurar o seu médico para ser reavaliado.

Os pacientes com sensibilidade aumentada a dropropizina devem ter cuidado ao dirigir veículos ou operar máquinas, devido à possibilidade de hipotensão (queda da pressão arterial) ou sonolência.

VIBRAZIN deve ser usado com cuidado em idosos e em pacientes com alteração da função dos rins ou do fígado.

É recomendável que o uso de antitussígenos em crianças de 2 a 6 anos seja limitado.

Gravidez e Lactação

VIBRAZIN não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica.

Informe seu médico se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O uso de VIBRAZIN, junto com álcool e com depressores do SNC (Sistema Nervoso Central) pode levar a um aumento dos efeitos colaterais da dropropizina, como a hipotensão e a sonolência.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE.

INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.

INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

ATENÇÃO: ESTE MEDICAMENTO CONTÉM AÇÚCAR, PORTANTO, DEVE SER USADO COM CAUTELA EM PORTADORES DE DIABETES.

NÃO DEVE SER UTILIZADO DURANTE A GRAVIDEZ E AMAMENTAÇÃO, EXCETO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA. INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA A OCORRÊNCIA DE GRAVIDEZ OU AMAMENTAÇÃO NA VIGÊNCIA DO TRATAMENTO OU APÓS O SEU TÉRMINO.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Xarope pediátrico: translúcido, vermelho e homogêneo.
- Xarope adulto: translúcido, vermelho e homogêneo.
- Solução oral (gotas): solução vermelha, homogênea e translúcida.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

- Xarope pediátrico: odor característico de framboesa.
- Xarope adulto: odor característico de framboesa.
- Solução oral (gotas): odor característico de framboesa.

POSOLOGIA

Xarope Pediátrico:

Crianças de 2 a 3 anos: ¼ a ½ do copo medida 4 vezes ao dia.

Crianças acima de 3 anos: 1 copo medida (10 mL), 4 vezes ao dia.

Xarope adulto:

Adultos e crianças acima de 12 anos: 1 copo medida (10 mL), 4 vezes ao dia.

Solução Oral (Gotas):

Crianças de 2 a 3 anos: 4 a 8 gotas, 4 vezes ao dia.

Crianças acima de 3 anos: 15 gotas, 4 vezes ao dia.

Adultos: 30 gotas, 4 vezes ao dia.

Obs: Cada mL de VIBRAZIN Solução Oral (Gotas), contém 30 gotas.

O QUE DEVO FAZER SE ESQUECER DE TOMAR UMA DOSE DO MEDICAMENTO?

Entre em contato com seu médico.

SIGA A ORIENTAÇÃO DO SEU MÉDICO, RESPEITANDO SEMPRE OS HORÁRIOS, AS DOSES E A DURAÇÃO DO TRATAMENTO.

NÃO INTERROMPA O TRATAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE SEU CIRURGIÃO-DENTISTA.

NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

As reações adversas raramente são observadas nas doses recomendadas. No caso de uso em doses mais altas ou de sensibilidade aumentada a dropropizina,