



Visalmin[®]

cloranfenicol



FORMA FARMACÊUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO

Solução ocular: embalagem contendo um frasco goteador com 10 mL.

USO OFTÁLMICO

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada mL de solução ocular contém:

cloranfenicol	4 mg
veículo q.s.p.	1 mL
(edetato dissódico di-hidratado, propilenoglicol, ácido bórico, borato de sódio, metilparabeno, propilparabeno e água).	

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

- **Ação esperada do medicamento:** ação antimicrobiana.
- **Cuidados de armazenamento:** o produto deve ser armazenado evitando calor excessivo (temperatura superior a 40°C), protegido da luz e umidade.
- **Prazo de validade:** 24 meses a contar da data de sua fabricação. Não use medicamento com prazo de validade vencido.
- **Gravidez e lactação:** informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se estiver amamentando.
- **Cuidados de administração:** instile a dose recomendada no saco conjuntival, evitando tocar a ponta do frasco nos tecidos oculares. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
- **Interrupção do tratamento:** não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
- **Reações adversas:** informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

- **Contraindicações e precauções:** informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

O cloranfenicol é um antibiótico que atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Possui amplo espectro de ação antimicrobiana e é eficaz contra micro-organismos Gram-positivos e Gram-negativos, tais como *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus hemolyticus* e *Moraxella lacunata* (bacilo de Morax-Axenfeld).





INDICAÇÕES

Infecções oculares superficiais, envolvendo a córnea e/ou a conjuntiva, causadas por micro-organismos sensíveis ao cloranfenicol.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

O uso prolongado de antibióticos pode ocasionalmente favorecer a infecção por micro-organismos não sensíveis.

Raros casos de hipoplasia medular, inclusive anemia aplástica, foram relatados após o uso tópico de cloranfenicol.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações com outros medicamentos.

REAÇÕES ADVERSAS

Infecções secundárias por micro-organismos não sensíveis. Discrasias sanguíneas. Reações de hipersensibilidade.

POSOLOGIA

Instile 1 ou 2 gotas no olho afetado, a cada 1 ou 2 horas, de acordo com a orientação médica.

SUPERDOSAGEM

Em geral, superdosagens não provocam problemas agudos. Se, acidentalmente for ingerido, beba bastante líquido para diluir, ou procure orientação médica.

PACIENTES IDOSOS

Não existem restrições de uso em pacientes idosos. A posologia é a mesma que a recomendada para as outras faixas etárias.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM
RETENÇÃO DA RECEITA**

® Marca Registrada

Reg. MS nº 1.0577.0053

Número do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho

Farm. Resp.: Dr. Marcelo Ramos - CRF-SP nº 16.440

Bunker Indústria Farmacêutica Ltda.

Rua Aníbal dos Anjos Carvalho, 212

Cidade Dutra - São Paulo - SP

C.N.P.J. 47.100.862/0001-50 - Indústria Brasileira



BK03719

