



VISIPLEX



cloridrato de nafazolina
sulfato de zinco heptaidratado

FORMA FARMACÊUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO:

Solução Ocular: embalagem contendo um frasco com 15 mL.

USO OFTÁLMICO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS

COMPOSIÇÃO

Cada mL de colírio contém:

cloridrato de nafazolina	0,15 mg
sulfato de zinco heptaidratado	0,30 mg
veículo q.s.p.	1,0 mL
(cloreto de sódio, ácido bórico, borato de sódio e água).	

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento: Visiplex colírio descongestiona os olhos vermelhos, aliviando as irritações.

Cuidados de armazenamento: Após a abertura do frasco não tocar a ponta do mesmo a fim de evitar contaminações. O produto deve ser conservado bem fechado e em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

Prazo de validade: O prazo de validade está indicado na embalagem produto. Ao adquirir o medicamento, confira sempre o prazo de validade impresso na embalagem externa do produto. **Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento, pois pode ser prejudicial à sua saúde.**

Gravidez e lactação: Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando.

Cuidado de administração: Instilar o colírio no canto do olho, evitando tocar a ponta do frasco nos tecidos oculares. Remover as lentes de contato antes de instilar o colírio. **Reações adversas:** Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como: dilatação pupilar, aumento da pressão intraocular, dor de cabeça, pressão alta, náusea, sudorese, fraqueza, aumento da irritação ocular, hipertireoidismo. Se a irritação persistir ou aparecer dor, consulte um oftalmologista.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Contraindicações e Precauções: Contraindicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Não use em casos de glaucoma de ângulo estreito ou doenças oculares graves. Não use se estiver se medicando com um inibidor da monoaminoxidase (MAO).

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.

PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM ADULTOS. O USO EM CRIANÇAS REPRESENTA RISCO À SAÚDE. NÃO USAR EM CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Farmacodinâmica

O cloridrato de nafazolina, um agonista imidazólico alfa-adrenérgico, é largamente empregado em oftalmologia devido a sua ação vasoconstritora. O sulfato de zinco é um adstringente ocular. O produto descongestiona os olhos vermelhos, aliviando as irritações.

Farmacocinética

Foi relatada absorção sistêmica após aplicação tópica de soluções de nafazolina. A nafazolina não é usada sistemicamente, porém é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal. O grau de absorção de zinco tópico é influenciado pela base na qual o componente zinco está contido e pelas condições da pele (intacta ou lesada).

INDICAÇÕES

Colírio adstringente para o tratamento das irritações oculares (poeira, vento, calor, fumaça,





gases irritantes, luz e corpos estranhos).

CONTRAINDICAÇÕES

Contraindicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Não use em caso de glaucoma de ângulo estreito ou doenças oculares graves. Não use se estiver se medicando com um inibidor da MAO.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Este colírio deve ser usado com precaução em pacientes com problemas cardiovasculares, no diabete, na hipertensão, no hipertiroidismo devido a nafazolina. Remover as lentes de contato antes de instilar o colírio.

PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM ADULTOS. O USO EM CRIANÇAS REPRESENTA RISCO À SAÚDE. NÃO USAR EM CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O uso concomitante deste colírio é desaconselhável em caso em que o paciente esteja fazendo uso de um medicamento com ação inibidora da MAO.

REAÇÕES ADVERSAS

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como: dilatação pupilar, aumento da pressão intraocular, dor de cabeça, hipertensão, náusea, sudorese, fraqueza, aumento da irritação ocular, hipertiroidismo. Se a irritação persistir ou aparecer dor, consulte um oftalmologista.

POSOLOGIA

Instilar 1 ou 2 gotas sobre o olho afetado, quando necessário, até 4 vezes ao dia. Se a irritação persistir ou se sentir dores oculares ou alteração na visão, consulte o médico.

Modo de usar:

- 1) Recline a cabeça para trás com os olhos fechados, aproxime o gotejador no canto do olho.
- 2) Aperte levemente o frasco plástico, para gotejar o produto. Abra e feche os olhos duas ou três vezes.

SUPERDOSAGEM

Cuidados especiais devem ser empregados quando um excesso do produto for instilado no olho, tais como: lavá-lo com água ou soro fisiológico. Se acidentalmente for ingerido, aconselha-se beber bastante líquido para provocar diluição.

PACIENTES IDOSOS

Deve-se ter cautela na administração em pacientes idosos com graves problemas cardiovasculares como arritmia e hipertensão, pois pode ocorrer exacerbação destas condições.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

Reg. MS nº 1.0577.0057

Número do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho

Farm. Resp.: Dr. Marcelo Ramos - CRF-SP nº 16.440

Bunker Indústria Farmacêutica Ltda.

Rua Anibal dos Anjos Carvalho, 212 - Cidade Dutra - São Paulo - SP

C.N.P.J. 47.100.862/0001-50 - Indústria Brasileira



BK03061

