

INDICAÇÕES

- Solução oftálmica, adstringente e sedativa para o tratamento das irritações e infecções da conjuntiva. Conjuntivites, irritações oculares (poeira, vento, calor, fumaça, gases irritantes, luz e corpos estranhos).

CONTRA-INDICAÇÕES

- O uso do produto é contra-indicado em casos de glaucoma de ângulo estreito ou doenças oculares graves. Não use se estiver se medicando com um inibidor da MAO. Hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Este colírio deve se usado com precaução em pacientes com problemas cardiovasculares, no diabete, na hipertensão, no hipertiroidismo devido à nafazolina. Remover as lentes de contato antes de instilar o colírio.

-PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM ADULTOS. O USO EM CRIANÇAS REPRESENTA RISCO À SAÚDE. NÃO USAR EM CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

- O uso concomitante deste colírio é desaconselhável em casos em que o paciente esteja fazendo uso de um medicamento com ação inibidora da MAO.

REAÇÕES ADVERSAS

- Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como: dilatação pupilar, aumento da pressão intra-ocular, dor de cabeça, hipertensão, náusea, sudorese, fraqueza, aumento da irritação ocular, hipertiroidismo. Se a irritação persistir ou aparecer dor, consulte um oftalmologista.

POSOLOGIA

Instilar 1 ou 2 gotas sobre o olho afetado, quando necessário, até 4 vezes ao dia. Se a irritação persistir ou se sentir dores oculares ou alteração na visão, consulte o médico.

Modo de usar

- Recline a cabeça para trás com os olhos fechados, aproxime o gotejador no canto do olho.

-Aperte levemente o frasco plástico, para gotejar o produto. Abra e feche os olhos duas ou três vezes.

SUPERDOSAGEM

- Cuidados especiais devem se empregados quando um excesso do produto foi instilado no olho, tais como: lavá-lo com água ou soro fisiológico.

-Se acidentalmente for ingerido, aconselha-se beber bastante líquido para provocar diluição.

USO EM IDOSOS

- Deve-se ter cautela na administração em pacientes idosos com graves problemas cardiovasculares como arritmia e hipertensão, pois pode ocorrer exacerbação destas condições.

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade:
VIDE CARTUCHO

Reg. MS: 1.0392.0100

Farm. Resp. Dra. Giovana Bettoni - CRF-GO nº 4617

SAC
0800 622929

Vitapan

Indústria Farmacêutica Ltda.
Rua VPR 01 - Quadra 2A
Módulo 01 - DAIA - Anápolis - GO
CNPJ: 30.222.814/0001-31
Indústria Brasileira
www.vitapan.com.br

102761 - 09/08A



Vital Colírio

cloridrato de nafazolina

sulfato de zinco

USO ADULTO (ACIMA DE 12 ANOS DE IDADE)

USO OFTÁLMICO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Solução oftálmica: Embalagem contendo frasco plástico gotejador com 20mL.

COMPOSIÇÃO

Cada ml da solução oftálmica contém:

cloridrato de nafazolina.....0,15mg

sulfato de zinco.....0,30mg

Veículo q.s.p.....1mL

(clorobutanol, ácido bórico, borato de sódio e água para injetáveis).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- Ação esperada do medicamento: Descongestiona os olhos vermelhos, aliviando as irritações,

- Cuidados de conservação: Conservar o produto em temperatura ambiente (15-30°C). Proteger da luz e umidade.

- Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação (VIDE CARTUCHO). Não use medicamento com o prazo de validade vencido, pois pode ser prejudicial à sua saúde.

- "Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término, e se está amamentando".

- Cuidados de administração: instilar o colírio no canto do olho, evitando tocar a ponta do frasco nos tecidos oculares. Remover as lentes de contato antes de instilar o colírio.

Reações adversas: informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como: dilatação pupilar, aumento da pressão intra-ocular, dor de cabeça, pressão alta, náusea, sudorese, fraqueza, aumento da irritação ocular, hipertiroidismo. Se a irritação persistir ou aparecer dor, consulte um oftalmologista.

- "TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS".

-Contra-indicações: O uso do produto é contra-indicado em casos de glaucoma de ângulo estreito ou doenças oculares graves. Não use se estiver se medicando com um inibidor da MAO. Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula

- SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

-NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

- "PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM ADULTOS, O USO EM CRIANÇAS REPRESENTA RISCO À SAÚDE. NÃO USAR EM CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS".

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Farmacodinâmica

- O cloridrato de nafazolina é largamente empregado em oftalmologia devido a sua ação vasoconstritora e sulfato de zinco é um adstringente ocular. O produto descongestiona os olhos vermelhos, aliviando as irritações.

Farmacocinética

Foi relatada absorção sistêmica após aplicação tópica de soluções de nafazolina. A nafazolina não é usada sistemicamente, porém é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal. O grau de absorção de zinco tópico é influenciado pela base na qual o componente zinco está contido e pelas condições da pele (íntacta ou lesada).