

Vitergan Master

Panax ginseng C.A. Mey + ASSOCIAÇÃO

Forma farmacêutica e Apresentação

Cápsulas - caixa com 30 cápsulas.

USO ADULTO / VIA ORAL

Composição

Cada cápsula de Vitergan Master contém:

Extrato seco de *Panax ginseng* C. A. Mey. (contendo 2,8mg de ginsenosídeos) 40mg

(*)

palmitato de retinol (vitamina A)	4.000UI	400%
nitrato de tiamina (vitamina B1)	2mg	333%
riboflavina (vitamina B2)	2mg	308%
cloridrato de piridoxina (vitamina B6)	1mg	154%
cianocobalamina (vitamina B12)	1mcg	83%
ácido ascórbico (vitamina C)	60mg	267%
colecalfiferol (vitamina D)	400UI	400%
acetato de tocoferol (vitamina E)	10mg	298%
nicotinamida	15mg	187%
pantotenato de cálcio	10mg	400%
ácido fólico	0,4mg	333%
rutosídeos	20,0mg	
fumarato ferroso (equivalente a 10mg de ferro)	30,34mg	143%
fosfato de cálcio dibásico (equivalente a 103,5mg de cálcio).....	351,35mg.....	21%
e (80mg de fósforo).....		23%
sulfato de cobre (equivalente a 1mg de cobre elementar)	3,93mg	222%
gliconato de potássio (equivalente a 4mg de potássio).....	24mg	
sulfato de manganês (equivalente a 1mg de manganês)	3,07mg	87%
gliconato de magnésio (equivalente a 5mg de magnésio)	85,31mg	4%
óxido de zinco (equivalente a 1mg de zinco)	1,254mg	29%
lecitina de soja	92,0mg	
Excipiente..... q.s.p.....	1 cápsula	

Excipientes: óleo de soja, cera branca, polissorbato, óleo vegetal parcialmente hidrogenado, gelatina, glicerina, sorbitol, metilparabeno, propilparabeno, dióxido de titânio e corantes azul, amarelo tartrazina(FD&C nº5) e vermelho.

(*) Teor percentual do componente na posologia máxima relativo à Ingestão Diária Recomendada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento

Vitergan Master tem na sua formulação extrato de *ginseng*, vitaminas, minerais e oligoelementos que proporcionam um efeito tônico-estimulante.

Cuidados de armazenamento

O medicamento deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), ao abrigo da luz e da umidade.

Prazo de validade

36 meses após data de fabricação.

Não use medicamentos com o prazo de validade vencido.

Gravidez e lactação

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao seu médico se está amamentando.

Cuidados na administração

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Interrupção do tratamento

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Reações adversas

Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Ocasionalmente podem ocorrer distúrbios gastrointestinais. Em casos de uso prolongado de doses excessivas de diversas preparações de *Ginseng* foi relatada a ocorrência de nervosismo, insônia, erupções cutâneas e hipertensão arterial.

Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA (FD&C nº 5) que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Ingestão concomitante com outras substâncias

Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

Contra-indicações e precauções

Vitergan Master é contra-indicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula; na presença de distúrbios do metabolismo do cálcio, hipercalcemia e hipercalcúria respectivamente; em caso de hipervitaminose A e D; na presença de insuficiência renal; durante tratamentos com retinóides, como, por exemplo, contra a acne.

Não são conhecidas restrições para pacientes com idade superior a 65 anos.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Vitergan Master é composto de extrato de *Ginseng*, vitaminas, minerais e oligoelementos.

O extrato de *Ginseng* é standardizado e obtido a partir das raízes de *Panax ginseng*. As dosagens presentes na formulação do produto são adaptadas às necessidades fisiológicas diárias do organismo humano. Um fornecimento baixo de vitaminas, minerais e oligoelementos pode causar cansaço, diminuir a vitalidade e a resistência, retardar a convalescença e aumentar a debilidade. Em situações de aumento da demanda, as vitaminas, os minerais e os oligoelementos inibem e corrigem os distúrbios do metabolismo celular.

Vitergan Master melhora as condições físicas e/ou mentais.

Indicações

Vitergan Master é indicado nos estados de esgotamento, fadiga, sensação de fraqueza e diminuição da concentração. Também nos casos de nutrição mal balanceada ou deficiente, na convalescença prolongada, na melhora da resistência em geral; na prevenção e no tratamento dos sinais e sintomas da deficiência de vitaminas e minerais, causados pelo avanço da idade.

Contra-indicações

Vitergan Master é contra-indicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula; na presença de distúrbios do metabolismo do cálcio, hipercalcemia e hipercalcúria respectivamente; em caso de hipervitaminose A e D; na presença de insuficiência renal; durante tratamentos com retinóides, como, por exemplo, contra a acne.

Precauções

Nos pacientes hipersensíveis, as saponinas do *Ginseng* podem agir como estimulante, provocando insônia. Neste caso, tomar o medicamento logo ao levantar e não no período da tarde. Vitergan Master não deverá ser administrado por períodos prolongados em doses superiores às recomendadas (ver: **Posologia**).

Gravidez e Lactação: como ocorre com qualquer medicamento, o uso do produto durante a gravidez e o período de lactação somente deverá ocorrer sob orientação e controle médico.

Interação medicamentosa

Até o momento não são conhecidas interações com medicamentos ou alimentos.

Reações adversas

Ocasionalmente podem ocorrer distúrbios gastrointestinais. Em casos de uso prolongado de doses excessivas de diversas preparações de *Ginseng* foi relatada a ocorrência de nervosismo, insônia, erupções cutâneas e hipertensão arterial.

Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA (FD&C nº 5) que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica e urticária, em pessoas suscetíveis.

Posologia

Recomendam-se, nas duas ou três semanas iniciais, duas cápsulas ao dia, uma no café da manhã e outra no almoço, passando-se, a seguir, para uma cápsula ao dia, no café da manhã. A duração do tratamento fica a critério do médico.

Superdosagem

Até o momento não são conhecidos casos de intoxicação por superdosagem de Vitergan Master.

Em caso de superdosagem, recomenda-se uma terapêutica sintomática de apoio.

Recomendações para pacientes acima de 65 anos

Não são conhecidas restrições ou precauções especiais para o uso do produto em pacientes com idade superior a 65 anos.

M.S. 1.0155.0205 • Farm. Resp: Regina H. V. Souza / CRF-SP nº 6394

Marjan Indústria e Comércio Ltda

Rua Gibraltar,165 • Santo Amaro - São Paulo / SP • CEP: 04755-070

TEL: (11) 5642-9888 • CNPJ nº 60.726.692/0001-81