

TEXTO DE BULA- XAROPE VICK MEL

Informamos que o texto de bula é integralmente impresso no rótulo do produto.

Xarope
Vick®-Mel
guaifenesina 200mg/12,5ml
EXPECTORANTE
Sabor Mel, Mentol e Eucalipto

240 ml

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Composição: Cada 12,5 ml do produto contém: guaifenesina: 200mg. Veículos: açúcar hidrolisado, propilenoglicol, citrato de sódio, carboximetilcelulose de sódio, ácido cítrico anidro, benzoato de sódio, óxido de polietileno N.F., polisorbato 60, sweetung 4601 (aspartame e acessulfamo K), mel, sistema flavorizante sabor mel, mentol e eucalipto, água purificada.

Atenção diabéticos: contém açúcar. Fenilcetonúricos: contém fenilalanina.

Contra-indicado em casos de hipersensibilidade a guaifenesina ou a qualquer componente do produto.

Cuidados de conservação e uso: Proteger da luz e umidade. Conservar a temperatura ambiente (15°C à 30°C).

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica. Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade.

Ação do medicamento: esse medicamento é um xarope expectorante que ajuda na eliminação do catarro em tosse produtivas. A guaifenesina fluidifica o catarro, tornando-o menos viscoso e mais “solto”. Dessa forma, o catarro é expelido de maneira mais fácil.

Riscos do medicamento: Advertências: não tome este medicamento em caso de tosse crônica como a causada por asma, fumo, bronquite crônica ou enfisema, ou se a tosse vier acompanhada de muco excessivo, a menos que indicado por um médico. Não exceda a dose recomendada. Não utilize por mais de 5 dias. Consulte seu médico se a tosse persistir por mais de 5 dias, tender a reincidir, vier acompanhada de febre, erupções cutâneas, dor de garganta ou dor de cabeça persistente.

Atenção: Este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado com cautela por portadores de diabetes.

Se os sintomas não melhorarem consulte seu médico.

Não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica.

Informe ao seu médico se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.

Até o momento não foram descritas interações da guaifenesina com outros fármacos.

Modo de uso: o produto consiste de um xarope translúcido de cor amarelo-alaranjada (semelhante ao mel). Odor e sabor são definidos pelo sistema flavorizante mel, mentol e eucalipto. **Agite antes de usar.** Tomar a dose recomendada para o produto, de acordo com a faixa etária/peso, utilizando o copo dosador do produto. **Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

Posologia e administração (usar o copo dosador na marca apropriada)-

Adultos e crianças maiores de 12 anos (mais de 43 Kg)	12,5 ml a cada 4 horas
Crianças de 6 a 12 anos (22 a 43Kg)	8,31 ml a cada 4 horas
Crianças de 2 a 6 anos (12.5 a 21kg)	4,19 ml a cada 4 horas

Não exceder 6 doses por dia. Em caso de esquecer uma dose, tome logo que possível, a menos que esteja perto da próxima dose; não tome dose dupla. Não existem recomendações especiais ou precauções sobre o uso do produto por pacientes idosos.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido.

Reações adversas: pouco frequentes ou raras- náuseas, vômitos, diarreia, erupção cutânea, dor de estômago, dor de cabeça, sonolência e vertigem.

Conduta em caso de superdosagem: o sintoma que caracteriza a superdosagem é o vômito. O indivíduo deve ser levado imediatamente ao atendimento médico emergencial sem que nenhuma outra conduta seja tomada.

Fabricado por Nycomed Pharma Ltda, Rodovia SP 340 s/n, Km 133,5 Jaguariúna – SP, CNPJ 60.397.775/0008-40. Para Procter & Gamble Higiene e Cosméticos LTDA, - Rua Francisco Pereira Dutra, 2405 - Galpão A - Estiva, CEP 13290-000 Louveira - SP. CNPJ: 67.712.562/0017-04. Indústria Brasileira. MS: 1.2143.0004. 010-3. Farm. Resp.: Silvia C. M. de Freitas CRF/S.P. nº 29.871. ®Marcas registradas por The Procter & Gamble Co. (1mm)

SAC: 0800 7015515 - Caixa Postal 19226 CEP 04505-970/São Paulo - SP.