

Yomax®

Cloridrato de ioimbina

### **FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES: - Yomax**

Comprimidos de 5,4 mg. Caixa contendo 60 comprimidos

USO ADULTO

### **COMPOSIÇÃO: - Yomax**

Cada comprimido contém:

Cloridrato de ioimbina ..... ,4 mg

Excipientes\* q.s.p. .... 1 comprimido

\*Excipientes: estearato de magnésio, lactose, celulose microcristalina, dióxido de silício coloidal.

### **INFORMAÇÕES AO PACIENTE: - Yomax**

Ação esperada do medicamento: YOMAX® é um medicamento utilizado principalmente por urologistas no tratamento e/ou no diagnóstico de certos tipos de disfunções da ereção masculina. Pode ser utilizado também em certos casos de hipotensão.

Cuidados de armazenamento: YOMAX® deve ser mantido em sua embalagem original, na temperatura ambiente (entre 15 e 30C) e ao abrigo da luz e da umidade.

Prazo de validade: Não utilize medicamento com a validade vencida. O prazo de validade de YOMAX® esta impresso na embalagem e é de 24 meses apos a data de fabricação.

Gravidez e lactação: YOMAX® não é indicado para mulheres, e não deve ser usado também durante a gravidez ou amamentação.

Cuidados de administração: Siga rigorosamente as recomendações de seu medico e a dosagem prescrita.

Não aumente as dosagens nem altere o tratamento sem o conhecimento de seu medico. Tome os comprimidos apos as refeições, com um copo de agua.

Interrupção do tratamento: Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu medico.

Reações Adversas: Informe seu medico se ocorrer qualquer reação desagradável durante o tratamento.

As reações podem ser: dor de cabeça, náuseas, vômitos, aumento da pressão, rubor da pele, irritabilidade e vertigem.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Ingestão concomitante com outras substâncias: Não tome qualquer outro medicamento a não ser por indicação e com o conhecimento do seu medico.

Contra- indicações e precauções: Informe seu medico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do inicio ou durante o tratamento.

Não deve ser usado durante a gravidez e a lactação.

Não deve ser administrado a crianças e a pacientes idosos.

YOMAX® e contra- indicado a pacientes que apresentam hipersensibilidade a ioimbina ou que apresentem doenças renais ou hepáticas, ulcera gastroduodenal, doenças nas coronárias, hipertensão. Informe seu medico caso apresente qualquer uma das doenças citadas. A eficacia deste medicamento depende da capacidade funcional do paciente.

Riscos da auto- medicação:

NÃO TOMA REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO; PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

## **INFORMAÇÕES TÉCNICAS - Yomax**

### **MODO DE AÇÃO - Yomax**

YOMAX® contem ioimbina, um alcalóide indolaquilaminico com estrutura química similar a reserpina. E o principal alcalóide da casca da arvore africana *Corynanthe yohimbe*, e e encontrado também na Rauwolfia Serpentina (L) Benth. A ioimbina bloqueia os receptores alfa- 2 adrenérgicos pré-sinápticos. Sua ação vasodilatadora periférica se assemelha com a da reserpina, embora mais fraca e de menor duração. O efeito da ioimbina sobre o sistema nervoso autônomo periférico e o aumento da atividade parassimpática (colinérgica) e a diminuição da atividade simpática (adrenérgica). Na performance sexual masculina a ereção esta ligada a atividade colinérgica e ao bloqueio alfa- 2 adrenérgico, os quais podem teoricamente resultar em aumento do tônus peniano, diminuindo o esvaziamento do fluxo no pênis ou ambos, provocando a estimulação erétil sem aumentar o desejo sexual. A ioimbina produz vasodilatação do corpo cavernoso pelo efeito alfa- antagonista. A ioimbina exerce ação estimulante sobre o humor e pode aumentar a ansiedade. Ambas as acoes não foram adequadamente estudadas ou relacionadas com a dosagem, entretanto aparentam necessitar de altas doses da droga. A ioimbina tem uma ação antidiurética moderada, provavelmente via estimulação dos centros hipotalâmicos e liberação do hormônio pituitário posterior. A ioimbina não parece exercer influencia significativa na estimulação cardíaca e em outros efeitos mediados pelos receptores beta- adrenérgicos. Seus efeitos sobre a pressão sanguínea são moderados.

### **INDICAÇÕES - Yomax**

YOMAX® e um medicamento midriático e simpatolítico. Disfunções sexuais masculinas, de origem psicogênica, vascular ou diabética, tem sido tratadas com sucesso com ioimbina. A ioimbina tem sido usada, principalmente por urologistas, no tratamento e/ou diagnóstico de certos tipos de disfunções da ereção masculina. E proposto também nos casos de hipotensão ortostática, particularmente naquela induzida pelos antidepressivos triciclícos.

## **CONTRA-INDICAÇÕES - Yomax**

Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Pacientes com disfunção renal ou hepática, angina pectoris, hipertensão e doenças cardíacas.

## **PRECAUÇÕES - Yomax**

Podem decorrer duas ou três semanas antes que os efeitos de YOMAX® se tornem evidentes. Pacientes recebendo ioimbina devem estar sob supervisão de especialistas habituados ao seu uso. Não utilizar YOMAX® em pacientes com distúrbios psiquiátricos ou cárdio- renais e com história de úlcera gastroduodenal.

Recomenda-se a monitorização periódica quanto à pressão arterial e frequência cardíaca. A eficácia deste medicamento depende da capacidade funcional do paciente. Geralmente o produto não é usado em mulheres.

### **Gravidez e Amamentação**

Não utilizar durante a gravidez, ou a amamentação.

### **Pediatria**

Não utilizar em crianças.

## **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS - Yomax**

Não administrar YOMAX® com antidepressivos ou drogas que modificam o humor. Com a clonidina e similares pode ocorrer uma inibição da atividade anti- hipertensiva (antagonismo a nível dos receptores).

## **REAÇÕES ADVERSAS - Yomax**

Sistema Nervoso Central: A ioimbina penetra facilmente no SNC e produz um complexo padrão de respostas com doses menores do que aquelas requeridas para produzir bloqueio alfa-adrenérgico. Estas incluem antidiurese e excitação central incluindo hipertensão e taquicardia, aumento da atividade motora, irritabilidade, vertigem e nervosismo. Foram relatadas como ocorrência rara: náusea ou vômito, cefaléia, transpiração, erupção cutânea, rubor e tremor.

## **POSOLOGIA - Yomax**

Adultos: Um comprimido de YOMAX® três vezes ao dia. Se ocorrerem reações como náusea, tontura ou

nervosismo, a dosagem pode ser reduzida para 1/2 comprimido, três vezes ao dia.

Posteriormente, a dose deve ser aumentada gradualmente para 1 comprimido três vezes ao dia.

O tratamento não deve ser superior a 10 semanas.

## **CONDUTA NA SUPERDOSAGEM - Yomax**

Doses diárias de 20 a 30 mg podem aumentar a frequência cardíaca e a pressão sanguínea e produzir rinorreia e piloereção. Sintomas mais severos, ligados a dosagens muito altas (1,8 g) podem incluir incoordenação, parestesias, tremores e estados dissociativos. A intoxicação deve ser tratada pelo restabelecimento do equilíbrio líquido e pela administração parenteral de adrenérgicos.

## **PACIENTES IDOSOS - Yomax**

Não utilizar em pacientes idosos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Nº do Lote; Data de Fabricação e Validade: vide Cartucho.

MS - 1.0118.0120

Farmacêutico Responsável:

Dr. Eduardo Sérgio Medeiros Magliano

CRF- SP nº

APSEN FARMACÊUTICA S/A

Rua La Paz, nº 37/67 - Santo Amaro

CEP 04755- 020 - São Paulo - SP

CNPJ 62.462.015/0001- 29

Indústria Brasileira

### **Yomax - Laboratório**

APSEN

RUA LA PAZ, 37/67. Santo Amaro.

São Paulo/SP - CEP: 04755020

Tel: 0800 165678

Email: [infomed@apsen.com.br](mailto:infomed@apsen.com.br)

Site: <http://www.apsen.com.br/>