



### ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

ZANOC® deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

® Marca Registrada

Reg. MS nº 1.0440.0063

Número do lote, data de fabricação e validade: vide cartucho

Farm. Resp.: Dra. Lauren Lobo Lustosa - CRF-SP nº 27.944

### Instituto Terapêutico Delta Ltda.

Estrada do Capovilla, 129

Distrito Industrial - Indaiatuba - SP

C.N.P.J. 33.173.097/0002-74

Indústria Brasileira



# Zanoc®

cetoconazol



### FORMA FARMACÊUTICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E APRESENTAÇÃO

Creme dermatológico: embalagem contendo uma bisnaga com 30 g.

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### USO TÓPICO

### COMPOSIÇÃO

Cada grama de creme contém:

cetoconazol ..... 20 mg

excipiente q.s.p. .... 1 grama

(metilparabeno, metabissulfito de sódio, propilenoglicol, álcool cetoestearílico, petrolato líquido, polissorbato 60, glicerol, acetato de cetila, álcool de lanolina acetilado, fenoxietanol, etilparabeno, propilparabeno, butilparabeno, edetato dissódico e água).

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

ZANOC® é um medicamento que você deve usar para o tratamento de infecções na pele causadas por fungos ou leveduras. O princípio ativo cetoconazol, possui potente atividade antimicótica (que combate a micose), agindo rapidamente no prurido proveniente de tais infecções.

O controle dos sintomas é observado progressivamente com o decorrer do tratamento. Sinais claros de melhora aparecem, geralmente, após 4 semanas de uso.

#### POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

ZANOC® é indicado para micoses de pele, frieira e pano branco (mancha branca arredondada na pele).

#### QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

#### CONTRAINDICAÇÕES

Você não deve usar ZANOC® em caso de maior sensibilidade

DE50901





(alergia) ao cetoconazol ou aos excipientes da formulação. Coceira e vermelhidão da pele após aplicação são os sintomas de maior sensibilidade.

#### **ADVERTÊNCIAS**

##### ***Gravidez e Amamentação***

Apesar de ZANOC® não ser absorvido, informe ao seu médico caso ocorra gravidez ou esteja amamentando durante o tratamento.

#### **PRECAUÇÕES**

Você não deve aplicar ZANOC® nos olhos, porque este medicamento não é indicado para infecções nos olhos.

#### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Se você utiliza corticosteroide creme, loção ou pomada, pode-se iniciar o tratamento com ZANOC® junto com este medicamento. A retirada do corticosteroide deve ser feita aos poucos, porque a pele pode apresentar reação de vermelhidão ou prurido. Para você continuar o tratamento com corticosteroide você deve usar o corticosteroide pela manhã e ZANOC® à noite por uma semana. Após esse procedimento, você deve aplicar o corticosteroide pela manhã a cada 2 ou 3 dias e ZANOC® todas as noites por 1 a 2 semanas. Então, pare de usar o corticosteroide e, se for necessário, use somente ZANOC®. Consulte o seu médico em caso de dúvidas.

**NÃO HÁ CONTRAINDICAÇÃO RELATIVA A FAIXAS ETÁRIAS.**

**INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.**

**INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.**

**NÃO USE O MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.**

#### **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

##### **Características Físicas e Organolépticas**

Creme de coloração branca, apresentando aspecto uniforme.

#### **POSOLOGIA**

Você deve aplicar ZANOC® nas áreas infectadas uma vez ao dia. O tratamento deve ser feito por períodos adequados, estendendo-se por mais alguns dias após desaparecerem os sintomas e as lesões. Você observa resultados favoráveis após 4 semanas de tratamento, dependendo do tipo de micose, extensão e intensidade das lesões. Você deve ter higiene, para auxiliar no controle de fatores de contaminação ou reinfecção.

#### **COMO USAR**

Você deve abrir o tubo desrosqueando a tampa. Fure o tubo com a ponta que está na própria tampa. Após lavar e secar bem a pele infectada, você deve passar ZANOC® delicadamente na pele com a ponta do dedo. Aplique na área infectada e ao redor dela. Lave as suas mãos com cuidado após aplicar o creme, pois isto evitará a transferência da doença para outras partes do seu corpo ou para outras pessoas. Mantenha roupas e toalhas de uso pessoal separadas, evitando contaminar seus familiares. Troque regularmente a roupa que está em contato com a pele infectada para evitar reinfecção.

**SIGA A ORIENTAÇÃO DE SEU MÉDICO, RESPEITANDO SEMPRE OS HORÁRIOS, AS DOSES E A DURAÇÃO DO TRATAMENTO.**

**NÃO INTERROMPA O TRATAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO.**

**NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.**

#### **QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?**

ZANOC® é em geral bem tolerado. Raramente pode ocorrer irritação ou sensação de ardor ou queimação na área da pele onde é aplicado.

#### **O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?**

Se você aplicar ZANOC® mais que a dose recomendada, pode ocorrer sensação de ardência, vermelhidão ou inchaço. Neste caso interrompa o uso de ZANOC®. A ingestão acidental de ZANOC® não é prejudicial à saúde mas, se isso ocorrer, procure o seu médico.

