

Acne Rosácea

Creme ou Gel com Ácido Azeláico

Ácido Azeláico	15 %
Alfabisabolol	1 %
Creme ou Gel qsp	50 g

Indicações: acne pápulo-pustulosa.

Modo de Usar: aplicar 1 a 2 vezes ao dia nas regiões afetadas, após limpeza de pele.

Creme Hidratante com Gluconolactona

Gluconolactona	2 - 10 %
Creme base hidratante qsp	100 g

Gel Creme com Gluconolactona

Gluconolactona	2 - 10 %
Gel Creme com Hostacerin qsp	100 g

Modo de Usar: aplicar 1 a 2 vezes ao dia nas regiões afetadas, após limpeza de pele.

Ref.: Draelos ZD et al. An evaluation of a polyhydroxy acid skin care regimen in combination with azelaic acid 15% gel in rosacea patients. *Journal of Cosmetic Dermatology* 2006, 5:23-29.

Permetrina Creme

Permetrina	1 - 5 %
Creme Base qsp	30 g

Modo de Usar: aplicar 1 vez por semana na região afetada.

Indicações: acne rosácea por *Demodex folliculorum*.

Ref.: 1. Forstinger C et al. Treatment of rosacea-like demodicidosis with oral ivermectin and topical permethrin cream. *J Am Acad Dermatol.* 1999 Nov;41(5 Pt 1):775-7. 2. Swenor ME. Is permethrin 5% cream effective for rosacea? *J Fam Pract.* 2003 Mar;52(3):183-4. 3. Kocak et al. Permethrin 5% cream versus metronidazole 0.75% gel for the treatment of papulopustular rosacea. A randomized double-blind placebo-controlled study. *Dermatology.* 2002;205(3):265-70.

Creme, Gel ou Loção com Metronidazol

Metronidazol	0,75 - 2 %
Creme, Gel ou Loção qsp	100 g

Modo de Usar: aplicar à noite nas regiões afetadas, com massagem.

Indicações: acne rosácea.

Ref.: 1. Dahl MV et al. Topical Metronidazole Maintains Remissions of Rosacea. *Arch Dermatol.* 1998;134:679-683. 2. A Comparative Study Of Metronidazole 1 % Cream Versus Azelaic Acid 20 % Cream In The Treatment Of Acne. Aksakal AB et al. *Gazi Medical Journal* 1997; 8 : 144-147. 3. Forton F et al. *Demodex folliculorum* and topical treatment: acaricidal action evaluated by standardized skin surface biopsy. *Br J Dermatol.* 1998 Mar ;138:461-6.