

Pomada de Whitfield (BP-2001)

Ácido benzóico	6 %
Ácido salicílico	3 %
Unguento emulsionante q.b.	100 g

Loção antimicótica

Ácido benzóico	2 %
Ácido salicílico	2 %
Iodo ressublimado	1 %
Tintura Benjoim	5 %
Álcool etílico 70 % q.b.	60 ml

Solução com ácido benzóico

Ácido benzóico	3 %
Iodo ressublimado	1 %
Iodeto de potássio	0,3 %
Licor de Hoffmann q.b.	30 ml

Talco antimicótico

Ácido benzóico	5 %
Ácido salicílico	2 %
Nitrato de miconazol	2 %
Mentol	0,5 %
Talco q.b.	100 g

- Martindale, *Guía completa de consulta farmacoterapéutica*, 1ª ed. (2003).

- *The Merck Index*, 13ª ed. (2001).

- *Formulación magistral de medicamentos*, COF da Biscaia, 5ª ed. (2004).

- *Monografías Farmacéuticas*, C.O.F. de Alicante (1998).

- *Formulario básico de medicamentos magistrales*, M.ª José Llopis Clavijo e Vicent Baixauli Comes (2007).

- *Formulario médico farmacéutico*, PharmaBooks, 2010.

- *Handbook of Pharmaceutical Excipients*, 6th ed., 2009.