

**ANTIINFLAMATÓRIOS  
ANTIEXSUDATIVOS  
ANTIPRURIGINOSOS**

*Uso Tópico:*

<b>LOÇÃO OU GEL ANTIINFLA- MATÓRIO</b>	Ácido Glicirrhízico ... ..... 2,0% Alfa-Bisabolol .. 1,0% Azuleno ..... 0,03% Extrato Vegetal ..... de Camomila ... 2,0ml Loção ou gel ..... ..... q.s.p.50g/ml	<b>Indicação:</b> Fotodermatose, foto- eczema, fotoalergia. <b>Ação:</b> Antiinflamatória, antialérgica, anti- eritematosa, bacte- ricida e cicatrizante.	<b>Uso:</b> Até 3 vezes ao dia, a critério médico.
--	--	--	--

O **Ácido Glicirrhízico** é um antiinflamatório não esteróide extraído do alcaçuz (Glicirrizia Glaba). Apesar de seu mecanismo de ação ainda ser desconhecido, observam-se excelentes propriedades antiinflamatória e antialérgica.

O **Alfa-Bisabolol** é um álcool monocíclico insaturado, componente do óleo essencial de Camomila. Apresenta propriedades antiinflamatória, bactericida e cicatrizante. É indicado em casos de pequenas lesões cutâneas, inflamações leves e queimaduras.

O **Azuleno**, substância obtida por síntese - quimicamente correspondente ao ciclo-pentaciclohepteno, é um antiinflamatório não esteróide oriundo da Camomila Romana. Exerce atividade antialérgica, de regeneração tissular além de antiinflamatória.

<b>GEL ANTIPRU- RIGINOSO</b>	Mentol ..... 0,2g Frescolat ..... 0,7g Extrato Vegetal de Camomila ..... 2,0ml Propilenoglicol.. 5,0g Álcool Etílico ..... 30,0ml CMC ..... 1,0g Água Destilada ..... ..... q.s.p.50g	<b>Indicação:</b> Antiinflamatória e antipruriginosa. <b>Ação:</b> Antiinflamatória e antipruriginosa.	<b>Uso:</b> 2 a 3 vezes ao dia, sobre as lesões. <b>Obs:</b> Crianças: 0,05 - 1,0g de mentol.
--------------------------------------	--	---	--

O **Frescolat**, Menthyl Lactate, é um cristal incolor não irritante que proporciona suave efeito refrescante.

<b>LOÇÃO ANTIPRU- RIGINOSA COM CALAMINA</b>	Mentol ..... 0,3g Cânfora ..... 0,6g Loção de Calamina... ..... 30,0ml Óleo de Oliva ... 60ml Água Destilada ..... ..... q.s.p.120ml	<b>Indicação:</b> Eczemas descamativos. <b>Ação:</b> Antipruriginosa.	<b>Uso:</b> 2 a 3 vezes ao dia, sobre as lesões.
---	--	---	---

<b>PASTA D'ÁGUA COM MENTOL E CÂNFORA</b>	Óxido de Zinco ..... 25ml	<b>Indicação:</b> Queimadura do sol e irritação cutânea. <b>Ação:</b> Protetora, secante, calmante, antipruriginosa e antiexsudativa.	<b>Uso:</b> 2 a 3 vezes ao dia.
	Água de Cal ..... 25ml Glicerina ..... 25ml Talco ..... 25g Mentol ..... 0,3g Cânfora ..... 0,6g ..... q.s.p.120ml		

<b>PASTA D'ÁGUA COM MENTOL</b>	Óxido de Zinco ..... 25ml	<b>Indicação:</b> Miliária Rubra. <b>Ação:</b> Protetora, secante, calmante, antipruriginosa e antiexsudativa.	<b>Uso:</b> 2 a 3 vezes ao dia.
	Água de Cal ..... 25ml Glicerina ..... 25ml Talco ..... 25g Mentol ..... 0,2g ..... q.s.p.120ml		

<b>TALCO MENTOLADO</b>	Mentol ..... 1g	<b>Indicação:</b> Dermatoses pruriginosas. <b>Ação:</b> Antipruriginosa.	<b>Uso:</b> Aplicar 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico.
	Frescolat ..... 1g Talco purificado ..... ..... q.s.p.100g		

O *Frescolat*, Menthyl Lactate, é um cristal incolor não irritante que proporciona suave efeito refrescante.

<b>SOLUÇÃO CANFORADA COMPOSTA</b>	Cânfora ..... 2%	<b>Indicação:</b> Dermatoses pruriginosas. <b>Ação:</b> Antipruriginosa, anestésica, calmante e refrescante.	<b>Uso:</b> Aplicar 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico.
	Benzocaína ..... 5% Propilenoglicol .. 10% Glicerina ..... 20% Água Destilada ..... ..... q.s.p.100ml		

<b>TALCO PARA MILIÁRIA</b>	Ácido Salicílico .... 1g	<b>Indicação:</b> Miliária, dermatoses exsudativas. <b>Ação:</b> Antiexsudativa.	<b>Uso:</b> Aplicar 2 a 3 vezes ao dia , a critério médico.
	Ácido Bórico ..... 5g Amido ..... 10g Óxido de Zinco .. 40g Frescolat ..... 0,7g Talco purificado ..... ..... q.s.p.100g		

<b>PASTA D'ÁGUA ESPECIAL</b>	Óxido de Zinco ..... 25ml Água de Cal ..... 25ml Glicerina ..... 25ml Talco ..... 25g Neomicina ..... 0,5% Enxofre ..... 7,0%	<b>Indicação:</b> Escabiose e eczemas infectados. <b>Ação:</b> Antiexsudativa, antipruriginosa e bactericida.	<b>Uso:</b> 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico.
<b>SOLUÇÃO DE THIERSCH</b>	Ácido Bórico ..... 12g Mentol ..... 2g Ácido Salicílico ..... 2g Álcool a 90° ..... 50ml Água Destilada ..... ..... q.s.p.120ml	<b>Indicação:</b> Antiinflamatória, antiexsudativa e antipruriginosa. <b>Ação:</b> Antiinflamatória, antiexsudativa e antipruriginosa.	<b>Uso:</b> Compressas, a critério médico.
<b>PASTA COM CALAMINA</b>	Calamina ..... 20,0g Bentonita ..... 2,5g Pasta d'água ..... ..... 100g	<b>Indicação:</b> Urticárias e piodermites. <b>Ação:</b> Antipruriginosa.	<b>Uso:</b> Usar 2 a 3 vezes ao dia nas lesões. <b>Obs:</b> Pode-se associar: Óxido Amarelo de Mercúrio .... 3,0g Ácido Salicílico... ..... 0,5-7,0g
<b>EMULSÃO DE CALAMINA COMPOSTA</b>	Benzocaína ..... 8% Calamina ..... 8% Talco de Veneza . 8% Solução de Burrow ..... 5% Emulsão base ..... ..... q.s.p.100ml	<b>Indicação:</b> Dermatites agudas, irritações cutâneas. <b>Ação:</b> Antipruriginosa, antiexsudativa, antisséptica e anestésica.	<b>Uso:</b> 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico.
<b>LOÇÃO ANTIPRURIGINOSA</b>	Mentol ..... 0,8g Cânfora ..... 0,6g Calamina ..... 5g LCD ..... 20% Óleo de Oliva ..... 10ml Água de Cal ..... ..... q.s.p.120ml	<b>Indicação:</b> Dermatoses pruriginosas. <b>Ação:</b> Antipruriginosa.	<b>Uso:</b> 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico.

<b>PASTA DE LASSAR</b>	Óxido de Zinco ..... 25g Amido ..... 25g Vaselina ..... ..... q.s.p.100g	<b>Indicação:</b> Antipruriginosa. <b>Ação:</b> Antipruriginosa.	<b>Uso:</b> Usar 2 a 3 vezes ao dia nas lesões, a critério médico.
----------------------------	--	---	---

<b>LINIMENTO DE CALAMINA</b>	Calamina ..... 10g Óxido de Zinco ..... 10g Óleo de Oliva ..... 35ml Água de Cal ..... 45ml	<b>Indicação:</b> Dermatoses pruriginosas. <b>Ação:</b> Antipruriginosa.	<b>Uso:</b> 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico.
----------------------------------	--	--	---

<b>LINIMENTO ÓLEO CALCÁREO</b>	Óleo de Linhaça ou de Amêndoas ..... 50ml Água de Cal ..... 50ml	<b>Indicação:</b> Dermatoses pruriginosas. <b>Ação:</b> Antipruriginosa.	<b>Uso:</b> 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico.
--	---	--	---

<b>SOLUÇÃO DE BURROW</b>	Acetato de Chumbo ..... 0,1g Sulfato de Alumínio ..... 1,0g Água Destilada ..... ..... q.s.p.100ml	<b>Indicação:</b> Dermatites agudas. <b>Ação:</b> Adstringente, antisséptica e antiexsudativa.	<b>Uso:</b> Compressas, a critério médico.
------------------------------	---	---	--

<b>EMULSÃO DE BURROW</b>	Óxido de Zinco ..... 10g Talco ..... 10g Óleo de Olivas ..... 45ml Lanolina ..... 10g Solução de Burrow ..... 2,5ml Água ..... ..... q.s.p.1.000ml	<b>Indicação:</b> Dermatites agudas. <b>Ação:</b> Adstringente, antisséptica, antiinflamatória e antiexsudativa.	<b>Uso:</b> 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico. <b>Obs:</b> Pode-se associar Acetato de Hidrocortisona-1%
------------------------------	---	--	---

<b>PERMANGA- NATO DE POTÁSSIO</b>	KMnO <sub>4</sub> ..... 1g	<b>Indicação:</b> Dermatites Exsudativas. <b>Ação:</b> Antiexsudativa, adstringente e antibacteriana.	<b>Uso:</b> A critério médico. Diluir o(s) pa- pel(éis) em 1 a 4 litros de água no momento do uso.
---	----------------------------	---	---

**Obs:** Os resíduos de coloração de *Permanganato de Potássio* em utensílios podem ser removidos com solução de Tiosulfato de Sódio ou vinagre.