

ECZEMAS

Uso Tópico:

CREME COM COALTAR	Coaltar 3,0g Ácido Salicílico 2,0g Cânfora 0,3g Mentol 0,5g Creme base q.s.p.100g	Indicação: Eczemas crônicos. Ação: Queratolítica, antissseborréica e antipruriginosa.	Uso: 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico.
--------------------------	--	--	---

CREME COM COALTAR E ÓLEO DE CADE	Coaltar 3,0g Óleo de Cade 5ml Mentol 1,0g Creme base q.s.p.100g	Indicação: Eczemas crônicos. Ação: Queratolítica, antissseborréica, antipruriginosa e antiinflamatória.	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
---	---	--	---

CREME COM ÁCIDO TARTÁRICO	Ácido Tartárico 5% Creme base q.s.p.80g	Indicação: Eczemas descamativos. Ação: Reidratante e ceratolítica	Uso: 2 vezes ao dia, à critério médico.
----------------------------------	--	--	---

O **Ácido Tartárico** é um *Alfa-hidroxi-ácido* que proporciona uma hidratação prolongada além de ajudar a remover as escamas e crostas da pele.

CREME COM ÓLEO DE PRÍMULA	Óleo de Prímula 10% Creme base q.s.p.80g	Indicação: Eczemas descamativos. Ação: Reidratante e reguladora do metabolismo dérmico.	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
----------------------------------	--	--	---

O **Óleo de Prímula**, extraído da *Primula Veris*, auxilia a manutenção do crescimento das células epidérmicas, regularizando o metabolismo dérmico, além de possuir propriedades reidratantes. Em Dermatologia pode ser usado na prevenção de eczemas descamativos não acompanhados de inflamação.

Vide seção de ANTIINFLAMATÓRIOS, ANTIPRURIGINOSOS e ANTIEXSUDATIVOS.

POMADA COM COALTAR E RESORCINA	Coaltar 3g Resorcina 5g Óxido de Zinco .. 15g Cânfora 1g Pomada ... q.s.p.100g	Indicação: Eczemas crônicos Ação: Queratolítica, antiséborréica, antipruriginosa e antiinflamatória.	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
POMADA COM ÁCIDO BÓRICO	Ácido Bórico 1 a 5g Óxido de Zinco 10g Talco 10g Vaselina 100g	Indicação: Eczemas subagudos. Ação: Antisséptica, adstringente e secativa.	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
PASTA DE LASSAR COM ICTIOL	Ictiol 3g Óleo de Oliva 10ml Pasta de Lassar q.s.p.100g	Indicação: Eczemas subagudos. Ação: Redutora, antisséptica, antipruriginosa e queratolítica.	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
LUVA INVISÍVEL	Uréia 5,0% Alantoína 0,5% Ácido Glicirrhízico 1,0% Alfa-Bisabolol .. 0,5% Silicone 5,0% Parsol MCX 2,5% Creme base q.s.p.80g	Indicação: Eczema das mãos. Ação: Reidratante, calman- te, reepitelizante, antiinflamatória e fotoprotetora.	Uso: A critério médico.

O **Ácido Glicirrhízico** é um antiinflamatório não-esteróide extraído do alcaçuz (Glicirriza Glabra). Apesar de seu mecanismo de ação ainda ser desconhecido, observam-se excelentes propriedades antiinflamatórias e antialérgicas.

O **Alfa-Bisabolol** é um álcool monocíclico insaturado, componente do óleo essencial de Camomila. Apresenta propriedades antiinflamatória, bactericida e cicatrizante. É indicado em casos de pequenas lesões cutâneas, inflamações leves e queimaduras.

Vide seção de ANTIINFLAMATÓRIOS, ANTIPRURIGINOSOS e ANTIEXSUDATIVOS.