

Edema de Córnea

1. Cloreto de Sódio Colírio

Cloreto de Sódio	5 %
Veículo qsp	10 ml

2. Cloreto de Sódio Gel ou Pomada

Cloreto de Sódio	5 %
Gel ou Pomada Oftálmica qsp	3,5 g

3. Cloreto de Sódio e Corticóide Colírio

Cloreto de Sódio	5 %
Dexametasona	0,01 %
Veículo qsp	5 ml

4. Cloreto de Sódio e Corticóide Pomada

Cloreto de Sódio	5 %
Dexametasona	0,01 %
Pomada Oftálmica qsp	3,5 g

Indicações: terapia adjunta para redução do edema de córnea de várias etiologias, incluindo ceratite bolhosa.

Modo de Usar: colírio - 1 a 2 gotas cada 3 a 4 horas; pomada ou gel - pequena quantidade 2 a 4 vezes ao dia.

Dimetilpolisiloxane Colírio

Octilfenol Polioxetileno	0,25 %
Diestearato de Polietilenoglicol	0,5 %
Dimetilpolisiloxane qsp	10 ml

Indicações: edema de córnea, erosões da córnea, prevenção de aderências conjuntivais e ceratoconjuntivais, tratamento de simbléfaros e pterigios, prevenção de reações alérgicas profissionais, presença de corpo estranho, estenose das vias lacrimais,clareamento da córnea para exames, como fundo de olho em traumatizados e como lubrificante ocular. Este colírio não deve ser empregado nos edemas supervenientes ao curso de uveítés agudas ou subagudas.

Modo de Usar: 1 a 6 gotas ao dia. Se o paciente estiver usando simultaneamente outros produtos oftálmicos, deve ser lembrado para aplicar em primeiro lugar os colírios aquosos, 5 minutos depois o colírio de Dimetilpolisiloxane e depois de mais 5 minutos, as pomadas ou géis.

Obs.: Ophthasiloxane® Alcon (Noruega).