

Docosanol no Tratamento do Herpes Simples Labial

Creme com Docosanol 10 %

Docosanol	10 %
Creme Excipiente qsp	10 g

Indicações: episódios agudos do herpes simples labial.

Obs.: este mostrou que o docosanol também foi eficiente na redução do tempo da dor e dos sintomas associados (prurido, queimação e/ou "formigamento").

Modo de Usar: aplicar 5 vezes ao dia.

Ref.: Sacks SL et al. Clinical efficacy of topical docosanol 10% cream for herpes simplex labialis: a multicenter, randomized, placebo-controlled trial. *J Am Acad Dermatol* 2001;45:222-230.

Foscarnet Creme Tópico para Infecção Mucocutânea por HSV

Creme com Foscarnet

Foscarnet	1 %
Creme Excipiente qsp	10 g

Modo de Usar: aplicar pequena quantidade nas lesões, 5 vezes ao dia.

Obs.: neste estudo, o creme foi utilizado 5 vezes ao dia por 34,5 dias em média, para verificar a segurança e eficácia do tratamento da infecção pelo vírus herpes simples tipo 1, mucocutâneo, em pacientes com AIDS e que não respondiam ao tratamento com aciclovir. Em 15 pacientes, 11 tiveram uma definição completa e 2 uma redução de pelo menos 50 % dos sintomas. Os efeitos adversos mais notados foram ulceração da pele, reações no local da aplicação, febre e cefaléias.

Ref.: Javaloy K et al. Treatment of Mucocutaneous Herpes Simplex Virus Infections Unresponsive to Acyclovir with Topical Foscarnet Cream in AIDS Patients: a Phase I/II Study. *J Acquir Immune Defic Syndr* 1999; 21(4):301-6.