

MICOSES
DERMATOFITOSES E CANDIDÍASE

Uso Tópico:

TIOCONAZOL EMULSÃO	Tioconazol 1% Emulsão O/A q.s.p.50ml	Indicação: Antifúngico de amplo espectro. Ação: Antifúngica e antibac- teriana Gram-positiva.	Uso: 1 a 2 vezes ao dia, a critério médico.
-------------------------------	--	--	--

O **Tioconazol** é um agente antifúngico sintético de amplo espectro que também possui atividade antibacteriana contra vários microrganismos Gram-positivos, incluindo *Staphylococcus* e *Streptococcus* spp. *In vitro* tem ação antifúngica contra dermatófitos patogênicos, leveduras e outros fungos. **Tioconazol** se mostrou eficaz no tratamento de todas as infecções comumente causadas por dermatófitos antropofílicos e zoofílicos, especialmente *Trichophyton rubrum*, *Candida*, *Pityrosporum ovale* e infecção bacteriana causada pelo *Corynebacterium minutissimum*.

TIOCONAZOL CREME	Tioconazol 1% Creme base q.s.p.50g	Indicação: Antifúngico de amplo espectro. Ação: Antifúngica e antibac- teriana Gram-positiva.	Uso: 1 a 2 vezes ao dia, a critério médico.
-----------------------------	--	--	--

TIOCONAZOL SOLUÇÃO 28%	Tioconazol 28% Ácido Undecilênico q.s. Solução base q.s.p.50ml	Indicação: Antifúngico de amplo espectro, no trata- mento de infecções micóticas das unhas causadas por fungos suscetíveis. Ação: Antifúngica e antibac- teriana Gram-positiva.	Uso: 1 a 2 vezes ao dia, a critério médico.
---------------------------------------	---	--	--

TIOCONAZOL TALCO	Tioconazol 1% Talco purificado q.s.p.50g	Indicação: Antifúngico de amplo espectro. Ação: Antifúngica e antibac- teriana Gram-positiva.	Uso: 1 a 2 vezes ao dia, a critério médico.
-----------------------------	--	--	--

CICLOPIROX OLAMINA CREME	Ciclopirox Olamina 1% Creme base q.s.p.50g	Indicação: Nas micoses cutâneas superficiais. Ação: Antifúngica	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
---	---	--	---

O **Ciclopirox Olamina** é um fungicida de amplo espectro para uso tópico, altamente eficaz praticamente contra todos os agentes patogênicos causadores de micoses cutâneas superficiais. Apresenta efeitos antiflogísticos e antibacterianos concomitantes sobre patógenos Gram-positivos e Gram-negativos.

Não deve ser aplicado na região ocular ou em feridas abertas.

SOLUÇÃO DE CICLOPIROX OLAMINA	Ciclopirox Olamina 1% Solução base q.s.p.50ml	Indicação: Nas micoses cutâneas superficiais. Ação: Antifúngica	Uso: 2 vezes ao dia, a critério médico.
--	--	--	---

KETOCONAZOL CREME	Ketoconazol 2% Creme base q.s.p.50g	Indicação: Infecções da pele causadas por <i>Candida</i> ou dermatófitos e <i>Pityrosporum ovale</i> . Ação: Antifúngica.	Uso: 1 a 2 vezes ao dia, a critério médico.
------------------------------	---	--	---

O **Ketoconazol** é um derivado imidazo-dioxolânico sintético com eficácia comprovada em infecções causadas por dermatófitos, leveduras e outros fungos patogênicos.

KETOCONAZOL COMPOSTO CREME	Ketoconazol 2% Valerato de Betametazona 0,1% Creme base q.s.p.50g	Indicação: Infecções da pele causadas por <i>Candida</i> ou dermatófitos e <i>Pityrosporum ovale</i> acompanhadas de prurido. Ação: Antifúngica, antialérgica e antipruriginosa.	Uso: 1 a 2 vezes ao dia, a critério médico.
---	---	---	---

O **Valerato de Betametazona** é um corticosteróide dotado de grande capacidade antiinflamatória e antipruriginosa. Sua atividade biológica tem meia-vida de mais de 48 horas.

CREME ESPECIAL COM KETOCONAZOL	Ketoconazol 2% Valerato de Betametazona 0,1% Sulfato de Neomicina 0,5% Creme base q.s.p.50g	Indicação: Infecções da pele causadas por Candida ou dermatófitos e Pityrosporum ovale, acompanhadas de prurido e infecção. Ação: Antifúngica, antialérgica, antipruriginosa e bactericida.	Uso: 1 a 2 vezes ao dia, a critério médico.
---	--	--	---

A **Neomicina** é um antibiótico de amplo espectro, inibidora de microrganismos Gram-negativos (Pr.Vulgaris, Enterobacter aerogenes) e Gram-positivos (Staph. aureus).

KETOCONAZOL SHAMPOO	Ketoconazol 2% Shampoo base q.s.p.120ml	Indicação: Pitiríase Versicolor , Dermatite Seborréica e Caspa. Ação: Antifúngica e anti-seborréica	Uso: A critério médico.
--------------------------------	---	--	-----------------------------------

OXICONAZOL CREME	Oxiconazol 1% Creme base q.s.p.50g	Indicação: Infecções da pele causadas por Candida ou dermatófitos, Pityrosporum ovale e bactérias Gram-positivas. Ação: Antifúngica e antibacteriana Gram-positiva.	Uso: 1 vez ao dia, a noite - ou a critério médico.
-----------------------------	--	--	--

OXICONAZOL LOÇÃO	Oxiconazol 1% Loção hidroalcoólica q.s.p.50ml	Indicação: Infecções da pele causadas por Candida ou dermatófitos, Pityrosporum ovale e bactérias Gram-positivas. Ação: Antifúngica e antibacteriana Gram-positiva.	Uso: 1 vez ao dia, a noite - ou a critério médico.
-----------------------------	--	--	--

OXICONAZOL TALCO	Oxiconazol 1% Talco purificado q.s.p.50g	Indicação: Antifúngico de amplo espectro. Ação: Antifúngica e antibac- teriana Gram-positiva.	Uso: 1 a 2 vezes ao dia, a critério médico.
-----------------------------	--	--	--

ISOCONAZOL CREME	Isoconazol 1 a 2% Creme base q.s.p.50g	Indicação: Micoses superficiais da pele e Eritrasma. Ação: Antifúngica.	Uso: 1 vez ao dia, a critério médico.
-----------------------------	---	---	---

O **Isoconazol** é um agente antifúngico imidazólico indicado em casos de micoses superficiais da pele, como por exemplo nos espaços interdigitais dos pés ou das mãos, nas regiões ínguino-crural e genital.

ISOCONAZOL LOÇÃO	Isoconazol 1 a 2% Loção Alcoólica q.s.p.50ml	Indicação: Micoses superficiais da pele e Eritrasma. Ação: Antifúngica.	Uso: 1 vez ao dia, a critério médico.
-----------------------------	---	---	---

CLOTRIMAZOL CREME	Clotrimazol 1% Creme base q.s.p.50g	Indicação: Infecções da pele causadas por Candida ou dermatófitos e Pityrosporum ovale. Ação: Antifúngica.	Uso: Até 3 vezes ao dia, a critério médico.
------------------------------	---	--	---

O **Clotrimazol** é um antifúngico que age ligando-se ao ergosterol da membrana celular de fungos sensíveis, com uma consequente alteração na permeabilidade da membrana, ocasionando a incapacidade desta de funcionar como barreira seletiva e permitindo assim o extravasamento de componentes intracelulares essenciais.

CLOTRIMAZOL EMULSÃO	Clotrimazol 1% Emulsão base q.s.p.50ml	Indicação: Infecções da pele causadas por Candida ou dermatófitos e Pityrosporum ovale. Ação: Antifúngica.	Uso: Até 3 vezes ao dia, a critério médico.
--------------------------------	--	--	---

CLOTRIMAZOL TALCO	Clotrimazol 1% Talco purificado q.s.p.50g	Indicação: Infecções da pele causadas por Candida ou dermatófitos e Pityrosporum ovale. Ação: Antifúngica.	Uso: Até 3 vezes ao dia, a critério médico.
MICONAZOL CREME OU EMULSÃO	Miconazol 2% Creme ou emulsão base q.s.p.50g/ml	Indicação: Infecções da pele causadas por Candida ou dermatófitos e Pityrosporum ovale. Ação: Antifúngica.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico.
MICONAZOL GEL ORAL	Miconazol 2% Sacarina q.s. Gel base q.s.p.50g	Indicação: Monilíase oral, queilites. Ação: Antifúngica.	Uso: 4 vezes ao dia, a critério médico.
MICONAZOL TALCO	Miconazol 2% Ácido Bórico 16% Talco purificado q.s.p.50g	Indicação: Infecções da pele causadas por Candida ou dermatófitos e Pityrosporum ovale. Ação: Antifúngica e antisséptica.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico.
ECONAZOL CREME OU EMULSÃO	Econazol 1% Creme ou emulsão base q.s.p.50g/ml	Indicação: Infecções da pele causadas por Candida ou dermatófitos e Pityrosporum ovale. Ação: Antifúngica.	Uso: Até 3 vezes ao dia, a critério médico.

EMULSÃO DE ECONAZOL COMPOSTA	Econazol 1% Cloreto de Benzalcônio 1% Emulsão base q.s.p.50ml	Indicação: Infecções da pele causadas por Candida ou dermatófitos e Pityrosporum ovale. Ação: Antifúngica e antisséptica.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico.
---	---	--	---

O **Cloreto de Benzalcônio** é um amônio quaternário com propriedades desinfetantes e antissépticas.

ECONAZOL TALCO	Econazol 1% Talco purificado q.s.p.50g	Indicação: Infecções da pele causadas por Candida ou dermatófitos e Pityrosporum ovale. Ação: Antifúngica.	Uso: Até 3 vezes ao dia, a critério médico.
---------------------------	--	--	---

CREME COM NISTATINA	Nistatina 0,25g Creme base q.s.p.50g	Indicação: Infecções da pele causadas por Candida. Ação: Antifúngica.	Uso: Até 4 vezes ao dia, a critério médico.
------------------------------------	--	---	--

A **Nistatina** é um antibiótico de ação fungistática e fungicida poliênico. Tem ação exclusivamente antifúngica, não apresentando atividade contra bactérias, protozoários ou vírus. 0,25g equivalem a aproximadamente 100.000UI.

CREME BORICADO COM NISTATINA	Nistatina 0,25g Ácido Bórico 3,0g Creme base q.s.p.50g	Indicação: Infecções da pele causadas por Candida. Ação: Antifúngica e antisséptica.	Uso: Até 4 vezes ao dia, a critério médico.
---	--	---	--

CREME ESPECIAL COM NISTATINA	Nistatina 0,25g Sulfato de Neomicina 0,5% Tirotricina 0,05% Creme base q.s.p.50g	Indicação: Infecções micóticas da pele acompanhadas de infecção bacteriana. Ação: Antifúngica e antibacteriana.	Uso: A critério médico.
---	---	---	--------------------------------------

SOLUÇÃO DE GRISEO- FULVINA	Griseofulvina 0,5g Ácido Salicílico 1,0g Álcool Etílico 50ml	Indicação: Tíneas e Onicomicoses. Ação: Antifúngica, antis- péptica e ceratolítica.	Uso: Até 2 vezes ao dia, a critério médico.
---	---	--	---

LOÇÃO DE SULFETO DE SELÊNIO	Sulfeto de Selênio 2,5% Propilenoglicol 10,0ml Álcool a 70° q.s.p.100ml	Indicação: Pitiríases Versicolor e Capitis. Ação: Antifúngica e anti-seborréica.	Uso: A critério médico.
--	--	---	--------------------------------------

O **Sulfeto de Selênio** não deve ser aplicado sobre a pele inflamada, exsudativa ou extensas áreas. Pode danificar jóias e bijouterias.

SHAMPOO DE SULFETO DE SELÊNIO	Sulfeto de Selênio 2,5% Shampoo base q.s.p.100ml	Indicação: Pitiríases Versicolor e Capitis. Ação: Antifúngica e anti-seborréica.	Uso: A critério médico.
--	---	---	--------------------------------------

LOÇÃO DE SULFA- CETAMIDA SÓDICA	Sulfacetamida Sódica 10% Loção hidroalcoólica. q.s.p.100ml	Indicação: Pitiríase Versicolor. Ação: Antifúngica e anti-seborréica.	Uso: A critério médico.
--	---	---	--------------------------------------

LOÇÃO SALICILADA DE SULFA- CETAMIDA	Sulfacetamida Sódica 8% Ácido Benzóico 1g Ácido Salicílico 2,0g q.s.p.100ml	Indicação: Pitiríase Versicolor. Ação: Antifúngica e anti-seborréica.	Uso: A critério médico.
--	---	---	--------------------------------------

LOÇÃO COM HIPOSSULFITO DE SÓDIO	Hipossulfito de Sódio 20 - 40% Água Destilada q.s.p.100ml	Indicação: Pitiríase Versicolor. Ação: Antifúngica.	Uso: À noite.
--	--	--	-------------------------

SOLUÇÃO SALI-BENZÓICA	Ácido Salicílico 2,0g Ácido Benzóico 3,0g Álcool a 50° q.s.p.100ml	Indicação: Micoses. Ação: Antifúngica e antisséptica.	Uso: 2 vezes ao dia, sobre as lesões.
SOLUÇÃO SAL-IODO	Ácido Salicílico 2,0g Iodo Metalóide 1,0g Propilenoglicol 20ml Álcool a 70° q.s.p.100ml	Indicação: Micoses. Ação: Antifúngica e antisséptica.	Uso: 2 vezes ao dia, sobre as lesões.
SOLUÇÃO ANTI-MICÓTICA COMPOSTA	Ácido Salicílico 1,5g Ácido Benzóico 3,0g Ácido Bórico 4,5g Propilenoglicol 3,0g Iodo Metalóide 0,45g Álcool a 70° q.s.p.150ml	Indicação: Micoses. Ação: Antifúngica e antisséptica.	Uso: 2 vezes ao dia, sobre as lesões.
SOLUÇÃO PARA TINEA PEDIS	Mentol 1,0g Timol 1,0g Fenol 1,0g Glicerina 5,0g Álcool a 60° q.s.p.100ml	Indicação: Tinea Pedis. Ação: Antifúngica e antisséptica.	Uso: 2 a 3 vezes ao dia, a critério médico.
TALCO ANTI-MICÓTICO	Mentol 0,2g Timol 1,0g Ácido Bórico ... 16,0g Carbonato de Magnésio 2,5g Talco q.s.p..100g	Indicação: Profilática. Ação: Antifúngica, antiséptica e secativa.	Uso: 1 vez ao dia, sobre as lesões.

GEL OU SOLUÇÃO DE VIOLETA DE GENCIANA	Violeta de Genciana 1 a 2% Gel ou Água Destilada q.s.p.30g/ml	Indicação: Monilíase e Candidíase. Ação: Antifúngica.	Uso: 1 vez ao dia, sobre as lesões.
SOLUÇÃO SALICILADA DE VIOLETA DE GENCIANA	Violeta de Genciana 0,5 a 2g Ácido Salicílico . 1,0g Álcool 90° q.s.p.100ml	Indicação: Monilíase e Candidíase de pele e unhas. Ação: Antifúngica.	Uso: 1 vez ao dia, sobre as lesões.
SOLUÇÃO DE OXSORALEN	Oxsoralen 0,1-1,0% Propilenoglicol 10,0% Álcool Etílico q.s.p.100ml	Indicação: Repigmentação cutânea. Ação: Induzidora da repigmentação cutânea.	Uso: Após 1 hora da aplicação, expor a lesão aos raios UV, iniciando com 1 minuto. A solução a 1% deve ser aplicada pelo médico semanalmente.

O *Oxsoralen* é utilizado para induzir a repigmentação cutânea do Vitiligo e de outras doenças como Psoríase e Eczema. É ineficiente quando se trata de Vitiligo extenso associado à total destruição dos melanócitos.

SABONETE ANTIMICÓTICO	Ácido Salicílico 4,0% Enxofre 10,0% Sabonete líquido, cremoso ou em barra q.s.p..100g/ml	Indicação: Micoses superficiais. Ação: Antifúngica e antisséptica.	Uso: A critério médico.
----------------------------------	--	---	-----------------------------------

Uso Interno:

CÁPSULAS DE FLUCONAZOL	Fluconazol 50-100-150mg	Indicação: Candidíases em geral e infecções por Criptococcus. Ação: Antifúngica.	Posologia: A critério médico.
---------------------------------------	--	---	---

O *Fluconazol* é um agente antifúngico triazólico que inibe potente e especificamente a síntese fúngica dos esteróides. É altamente específico para as enzimas

dependentes do citocromo fúngico P450. É indicado no tratamento da Candidíase sistêmica, incluindo Candidemia, Candidíase disseminada e outras formas de infecção invasiva por *Candida*, como Candidíase de mucosa, Candidúria, Candidíase mucocutânea e Candidíase oral atrófica crônica. É também indicado na prevenção de infecções fúngicas em pacientes com doenças malignas ou predispostas a tais infecções devido à quimioterapia citotóxica ou radioterapia.

A principal via de excreção é a renal, com aproximadamente 80% da dose administrada encontrada inalterada na urina. O clearance do ***Fluconazol*** é proporcional ao da creatinina. Recomenda-se cuidadosa monitorização do tempo de protrombina em pacientes que estejam recebendo anticoagulantes cumarínicos, e das concentrações de ciclosporina em pacientes que estejam recebendo ***Fluconazol***. A administração de ***Fluconazol*** concomitantemente à Rifampicina resultou em uma redução de 25% na AUC e 20% na meia-vida de ***Fluconazol***.

Os efeitos colaterais mais comumente associados ao ***Fluconazol*** são sintomas relacionados ao trato gastrintestinal, tais como: náusea, dor abdominal, diarréia e flatulência. O uso durante a gravidez deve ser evitado, exceto em pacientes com infecções fúngicas severas ou com potencial risco de vida. O uso durante a lactação não é recomendado.

A dose diária deve ser baseada na natureza e severidade da infecção fúngica, como segue:

QUADRO DE TERAPIA COM FLUCONAZOL		
PATOLOGIA	DOSE RECOMENDADA	TEMPO DE TRATAMENTO
Infecções por <i>Cryptococcus</i>	400mg no primeiro dia 200-400mg/dose única/dia	Até 8 semanas
Infecções invasivas por <i>Candida</i>	400mg no primeiro dia 200-400mg/dose única/dia	Baseado na resposta clínica
Candidíase orofaríngea	50mg/dose única/dia	7 a 14 dias
Candidíase oral atrófica	50mg/dose única/dia	14 dias
Prevenção de infecções fúngicas em pacientes com doenças malignas	50mg/dose única/dia	Enquanto o paciente estiver correndo riscos devido à administração de quimioterapia citotóxica ou radioterapia.
Infecções superficiais por <i>Candida</i> em crianças acima de 1 ano	1mg/kg corpóreo	Baseado na resposta clínica
Infecções sistêmicas por <i>Candida</i> ou <i>Cryptococcus</i> em crianças acima de 1 ano	3 - 6mg/kg corpóreo	Baseado na resposta clínica

XAROPE DE FLUCONAZOL	Fluconazol 5mg\2,5ml Xaropes de morango, framboesa, pêssego ou tutti-frutti q.s.p.100ml	Indicação: Candidíases em geral e infecções por Criptococcus. Ação: Antifúngica.	Posologia: A critério médico - vide quadro de terapia com Fluconazol.
-------------------------------------	--	---	---

Uma colher de **café** contém **2,5ml**;
 Uma colher de **chá** contém **5,0ml** ;
 Uma colher de **sobremesa** contém **10,0ml** e
 Uma colher de **sopa** contém **15,0ml**.

CÁPSULAS DE GRISEO- FULVINA	Griseofulvina 250 - 500mg	Indicação: Infecções da pele, unha, do couro cabe- ludo e pé causadas por Tinea. Ação: Antifúngica.	Posologia: A critério médico.
--	--	---	--

XAROPE DE GRISEO- FULVINA	Griseofulvina 5mg\5,0ml Xaropes de morango, framboesa, pêssego ou tutti-frutti q.s.p.100ml	Indicação: Infecções da pele, unha, do couro cabe- ludo e pé causadas por Tinea. Ação: Antifúngica.	Posologia: A critério médico.
--	---	---	--

A **Griseofulvina** inibe a mitose celular fúngica ao ocasionar o rompimento da estrutura do fuso mitótico, impedindo a metafase da divisão celular. É depositada, em vários graus, nas células precursoras da ceratina da pele, unha e do cabelo, fazendo com que a ceratina se torne resistente à invasão fúngica.

A **Griseofulvina** é principalmente absorvida no duodeno. As concentrações plasmáticas ocorrem por volta de quatro horas após a sua administração. Apresenta uma meia-vida de eliminação de 9-24 horas e é metabolizada no fígado. Os metabólitos são excretados principalmente na urina, enquanto que a **Griseofulvina** inalterada é excretada principalmente nas fezes.

Os barbituratos podem reduzir a eficácia do tratamento com a **Griseofulvina**, ao interferir na absorção gastrintestinal da droga. Sangramento repentino, amenorréia e insucesso no tratamento com anticoncepcionais foram relatados em pacientes. A **Griseofulvina** pode diminuir a resposta aos anticoagulantes cumarínicos administrados concomitantemente. Pode, ainda, comprometer a habilidade de alguns indivíduos para dirigir autos e operar máquinas. Não deve ser tomada durante a gravidez.

A dose usual é de 500mg diários em dose única ou fracionada, após as refeições.

Em condições graves pode-se administrar até o dobro desta quantidade, reduzindo ao nível mais baixo de acordo com a resposta clínica.

A dosagem para crianças é de 10mg por quilograma de peso corporal em dose única ou fracionada, após as refeições.

ITRACONAZOL CÁPSULAS	Itraconazol 200 - 300mg	Indicação: Blastomicose, Histoplasmose, Coccidiomicoses, Candidíase oral, Candidíase esofágica, Tinea, Micoses linfocutâneas e Aspergiloses. Ação: Antifúngica.	Posologia: A critério médico.
---------------------------------	--	---	---

O *Itraconazol* é um antimicótico imidazólico de largo espectro, tendo ação sobre Blastomyces spp., Histoplasma spp., Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus e Criptococcus neoformans. Exibe atividade contra Sporothrix schenckii, Trichophyton spp, Candida albicans e Candida spp.

Estudos “in vitro” demonstraram que o *Itraconazol* inibe a esterol 14-alfa-desmetilase, um sistema enzimático dependente do citocromo P450, prejudicando a biossíntese do Ergosterol, que é vital para a arquitetura da membrana do fungo.

O *Itraconazol* inibe o metabolismo do Astemizol. É contra-indicado na gravidez e lactação. Em caso de superdosagem, o *Itraconazol* não pode ser removido por diálise, sendo recomendada a lavagem gástrica e medidas de apoio.

A dose recomendada é de 200 a 400mg em uma única tomada diária, às refeições. Alguns estudos preconizam doses iniciais de 600mg diários por três dias, reduzindo-a posteriormente.

CÁPSULAS DE KETO- CONAZOL	Ketoconazol 200mg	Indicação: Micoses superficiais e profundas. Ação: Antifúngica.	Posologia: 200 a 400mg ao dia, a critério médico.
--	----------------------------------	---	--

O *Ketoconazol* é um agente antifúngico imidazólico que interfere na síntese do Ergosterol e, portanto, altera a permeabilidade da membrana celular de fungos sensíveis.

CÁPSULAS DE NISTATINA	Nistatina 500.000UI	Indicação: Infecções por Candida albicans. Ação: Antifúngica.	Posologia: A critério médico.
--------------------------------------	------------------------------------	---	--

SUSPENSÃO ORAL DE NISTATINA	Nistatina 100.000UI/ml Suspensão oral q.s.p.50ml	Indicação: Infecções por Candida albicans. Ação: Antifúngica.	Posologia: A critério médico.
JUJUBAS DE NISTATINA	Nistatina 100.000UI Excipiente q.s.p.1 jujuba	Indicação: Infecções orais por Candida. Ação: Antifúngica.	Posologia: A critério médico.
JUJUBAS ANTI-AFTAS	Cloridrato de Tetraciclina ... 250mg Nistatina 50.000UI Excipiente q.s.p.1 jujuba	Indicação: Infecções orais por Candida, aftas. Ação: Antifúngica e antibacteriana.	Posologia: A critério médico.
JUJUBAS DE COTRIMAZOL	Clotrimazol 10mg/unidade Excipiente q.s.p.1 jujuba	Indicação: Infecções orais por Candida. Ação: Antifúngica.	Posologia: A critério médico.
CÁPSULAS DE OXSORALEN	Oxsoralen 5-10mg	Indicação: Vitiligo, Psoríase e Eczema. Ação: Induzidora da repigmentação cutânea.	Posologia: Ingerir 2 horas antes de expor- se ao sol.

O **Oxsoralen** é utilizado para induzir a repigmentação cutânea do Vitiligo e de outras doenças como Psoríase e Eczema. É ineficiente quando se trata de Vitiligo extenso associado à total destruição dos melanócitos.