

# Capsaicina e Neuralgia Pós-Herpética

## Spray Tópico com Capsaicina

Capsaicina	0,075 %
Álcool Etílico	40 %
Propilenoglicol	10 %
Hidroxipropilcelulose	0,25 %
Água Destilada qsp	100 ml

Modo de Usar: aplicar o spray 3 a 4 vezes ao dia locais doloridos.

Indicações: neuropatia pós-herpética, neuropatia diabética dolorosa e outras dores de origem neurogênica; e para o alívio da dor em artrites e osteoartrites.

Obs.: pode ocorrer irritação local; não deve ser utilizado em lesões abertas; não deve ser usado em crianças com menos de 2 anos.

Ref.: 1. Mason L et al. Systematic review of topical capsaicin for the treatment of chronic pain. *BMJ*. 2004 Apr 24;328(7446):991. 2. Espana A, Redondo P. Update in the treatment of herpes zoster. *Actas Dermosifiliogr*. 2006 Mar;97(2):103-14. 3. Allen Jr LV (editor). Formulations - Capsaicin 0.075% Topical Spray. *International Journal of Pharmaceutical Compounding*. 2002 jan/feb;6(1):41.

## Creme com Capsaicina e Xilocaína

Capsaicina	0,025 %
Xilocaína	5 %
Creme Emoliente qsp	100 g

Modo de Usar: aplicar 4 a 5 vezes ao dia.

Ref.: 1. Bernstein J et al. Treatment of chronic postherpetic neuralgia with topical capsaicin. *J. Am. Acad. Dermatol.* 17: 93-96, 1987. 2. Watson P et al. Post-herpetic neuralgia and topical capsaicin. *Pain*, 33: 333-340, 1988.