

Queratose Actínica

Gel com Colchicina

Colchicina	0,5 - 1 %
Gel de Natrosol qsp	30 g

Modo de Usar: aplicar 2 vezes ao dia nas regiões afetadas.

Obs.: utilizar bloqueador solar durante o dia. Nos estudos abaixo, as lesões da queratose actínica mostraram significativa melhoria clínica depois do tratamento com ambas concentrações de colchicina. Não foram observados efeitos colaterais sistêmicos com nenhuma das duas concentrações. A colchicina tópica mostrou ser um agente eficaz e seguro, nas duas concentrações, para o tratamento da queratose actínica.

Ref.: 1. Akar A et al. Efficacy and safety assessment of 0.5% and 1% colchicine cream in the treatment of actinic keratoses. *J Dermatolog Treat.* 2001 dec;12(4):199-203. 2. Grimaire M et al. Topical colchicine therapy for actinic keratoses. *Dermatology.* 2000;200(4):346-348.

Creme com Imiquimod e 5-Fluoruracil

Imiquimod	5 %
5-Fluoruracil	5 %
Creme qsp	30 g

Modo de Usar: aplicar uma vez ao dia durante uma semana, ao longo de 3 meses.

Referência: Price NM. The treatment of actinic keratoses with a combination of 5-fluorouracil and imiquimod creams. *J Drugs Dermatol.* 2007 Aug;6(8):778-81.

Obs.: o objetivo deste trabalho foi descrever o regime de tratamento e a extensão dos efeitos colaterais no uso da aplicação combinada de 5-fluoruracil e imiquimod em creme, em pacientes com queratose actínica e demonstrar a comodidade e facilidade da metodologia do presente regime.