

Cromoglicato - Prevenção de Reações Alérgicas

Cromoglicato Cápsulas

Cromoglicato Dissódico 100 a 200 mg
Excipiente qsp 1 cápsula
Mande.....cápsulas

Cromoglicato Solução Oral

Cromoglicato Dissódico 100 mg
Solução Oral qsp 5 ml
Mande em Vidro com.....ml

Posologia: adultos - 200 mg 3 a 4 vezes ao dia; crianças acima de 2 anos - 100 mg 3 a 4 vezes ao dia; crianças menores de 2 anos - 20 mg/kg ao dia, divididos em 3 a 4 tomadas.

Indicações: alergia a alimentos, mastocitose, dermatite herpetiforme.

Obs.: o cromoglicato dissódico estabiliza a membrana dos mastócitos e impede a ativação e liberação dos mediadores químicos envolvidos na reação alérgica, sendo utilizados no tratamento preventivo.

Ref.: 1. Stefanini GF et al. Oral cromolyn sodium in comparison with elimination diet in the irritable bowel syndrome, diarrheic type. Multicenter study of 428 patients. *Scand J Gastroenterol* 1995 jun;30(6):535-41. 2. Zur E et al. Sodium cromoglycate in the treatment of food hypersensitivity in children under 3 years of age. *Pol Merkuriusz Lek* 2001 sep;11(63):228-32.