

TRH com Hormônios Bioidênticos

Gel Transdérmico PLO com Estriol e Estradiol (Bi-Est)

Estriol	2 mg
Estradiol (17 beta)	0,5 mg
Etoxidiglicol ou Propilenoglicol	1 %
Gel Transdérmico PLO qsp	1 ml

Gel Transdérmico PLO com Estriol, Estradiol e Estrona (Tri-Est)

Estriol	2 mg
Estradiol (17 beta)	0,25 mg
Estrona	0,25 mg
Etoxidiglicol ou Propilenoglicol	1 %

Mande.....seringas calibradas com 10 ml ou em....saches monodose com 0,5 a 1 ml.

Modo de Usar: 0,5 a 1 ml ao dia, alternando os locais de aplicação a cada dia.

Ref.: 1. Allen Jr LV (editor). Formulations - Estriol 2 mg/mL and Estradiol 0.5 mg/mL in Pluronic Lecithin Organogel (PLO). *International Journal of Pharmaceutical Compounding*. 2001 sep/oct;5(5):374. 2. Allen Jr LV (editor). Formulations - Triple Estrogen 2.5 mg/0.1 mL PLO. *International Journal of Pharmaceutical Compounding*. 2000 nov/dec;4(6):465.

Gel Transdérmico com Estriol 0,2 %

Estriol	2 mg
Propilenoglicol	1 %
Gel Transdérmico PLO qsp	1 ml

Mande 30 ml em seringa dosadora
ou em sache monodose com 1 ml.

Modo de Usar: aplicar 1 ml ao dia, alternando os locais de aplicação a cada dia.

Obs.: gel transdérmico PLO - guardar em temperatura ambiente. Este gel tem propriedade termo-reversa e se liquefaz quando resfriado em geladeira.

Ref.: Allen Jr LV (editor). Formulations - Estriol 0.2 mg/0.1 mL in Pluronic Lecithin Organogel. *International Journal of Pharmaceutical Compounding*. 1999 sep/oct;3(5):392.

Gel Transdérmico com Progesterona

Progesterona Micronizada	200 mg
Propilenoglicol	20 %
Gel Transdérmico PLO qsp	1 ml

Mande.....seringas calibradas com 10 ml ou em....saches monodose com 0,25 a 1 ml.

Modo de Usar: 0,5 a 1 ml ao dia, alternando os locais de aplicação a cada dia. É recomendado iniciar o tratamento com a menor dose e aumentar progressivamente até encontrar a dose ideal.

Indicações: reposição hormonal com hormônio bioidêntico, sangramento uterino disfuncional, endometriose, síndrome pré-menstrual, aborto habitual, infertilidade, supressão da lactação, osteoporose, inibição da produção de LH na síndrome do ovário policístico.

Ref.: Allen Jr LV (editor). Formulations - Progesterone 200 mg/mL in Pluronic Lecithin Organogel. *International Journal of Pharmaceutical Compounding*. 1999 sep/oct;3(5):398.