

Pilocarpina Oral para o Tratamento da Xerostomia

Pastilhas com Pilocarpina

Clorídato de Pilocarpina 2,5 mg
Excipiente qsp 1 pastilha
Mande.....pastilhas

Posologia: chupar 1 pastilha 2 a 3 vezes ao dia.

Obs.: A administração tópica mostrou resultados similares à terapia sistêmica com pilocarpina, mas a tolerância ao medicamento foi melhorada.

Ref.: 1. Hamlar DD et al. Determination of the efficacy of topical oral pilocarpine for postirradiation xerostomia in patients with head and neck carcinoma. *Laryngoscope* 1996 Aug;106(8):972-6. 2. Weaver ML et al. Salivary flow induction by buccal permucosal pilocarpine in anesthetized beagle dogs. *J Dent Res* 1992 Nov;71(11):1762-7. Dilvestre-Donat FJ et al. Prevention and management of radiotherapy complications in patients with head and neck tumors. *Medicina Oral* 1998;3:136-47.

Maltose Cristalina Anidra e Boca Seca

Pastilhas com Maltose Cristalina Anidra

Maltose Cristalina Anidra 200 mg
Excipiente qsp 1 pastilha
Mande.....pastilhas

Modo de Usar: chupar 1 pastilha 3 vezes ao dia.

Indicações: xerostomia, síndrome de Sjögren.

Ref.: Fox PC, et al. Use of orally administered anhydrous crystalline maltose for relief of dry mouth. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*. 2001;7(1):33-43.