


## POLITRAUMATIZADO – I (IDENTIFICAÇÃO)



São politraumatizados os pacientes com um ou mais traumas significativos de cabeça, tórax, abdome, trato urinário, pelve ou coluna e extremidades.

**FR** = Frequência Respiratória  
**PAS** = Pressão Sistólica

## POLITRAUMATIZADO II (IDENTIFICAÇÃO)

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejeção do automóvel</li> <li>- Morte no mesmo compartimento do passageiro</li> <li>- Atropelamento</li> <li>- Impacto de alta velocidade</li> <li>- Velocidade inicial &gt; 64 Km/h</li> <li>- Mudança de velocidade &gt; 32 Km/h</li> <li>- Maior deformidade &gt; 50 cm</li> <li>- Intrusão no compartimento do passageiro &gt; 30cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempo resgate &gt; 20min</li> <li>- Queda &gt; 20 pés (± 6 metros)</li> <li>- Capotagem</li> <li>- Lesão do pedestre com impacto significativo &gt; 8Km/h</li> <li>- Impacto de motocicleta &gt; 32Km/h com separação da roda do guidão</li> </ul>
--	---

SIM

Politraumatizados

NÃO

Avaliação dos Fatores de Risco

- Idade < 5 ou > 55 anos  
 - Presença de doença cardíaca, respiratória ou uso de medicações psiquiátricas  
 - Diabéticos em uso de insulina, cirrose, malignidade, obesidade ou coagulopatia

SIM

Politraumatizado

NÃO

Reavaliação com controle médico

QUANDO EM DÚVIDA, CONSIDERE TODO O ACIDENTADO UM POLITRAUMATIZADO

### ATENÇÃO

Exames de rotina em todos os politraumatizados

- Ht, Hb
- Grupo sanguíneo e fator Rh
- Amilase
- Radiografia de tórax AP
- Radiografia de bacia AP
- Radiografia de coluna cervical
- ECG
- βHCG na mulher em idade fértil
- Ultra-som do abdômen total

**ESCORE DE TRAUMA ADULTO**

VARIÁVEIS		ESCORE
Frequência Respiratória	10 a 24	4
	25 a 35	3
	> 36	2
	1 a 9	1
	0	0
Pressão Sistólica mm Hg	> 89	4
	70 a 89	3
	50 a 69	2
	1 a 49	1
	0	0
Escala de Coma Glasgow	13 a 15	4
	09 a 12	3
	06 a 08	2
	04 a 05	1
	< 04	0

**PACIENTE POLITRAUMATIZADO  
ESCORE DE TRAUMA PEDIÁTRICO**

AVALIAÇÃO	ESCORE		
	+2	+1	-1
PESO	>20kg	10 a 20Kg	< 10Kg
Vias aéreas	Normal	Via aérea nasal ou oral	Intubação ou Traqueostomia
Pressão arterial	> 90mmHg	50 a 90mmHg	< 50mmHg
Nível de consciência	Completamente desperto	Obnubilado ou qualquer perda da consciência	Comatoso
Lesões abertas	Nenhuma	Menor	Maior ou penetrantes
Fraturas	Nenhuma	Menor	Múltiplas ou penetrantes

**ESCALA DE COMA DE GLASGOW**

VARIÁVEIS		ESCORE
Abertura ocular	Espontânea	4
	À voz	3
	À dor	2
	Nenhuma	1
Resposta verbal	Orientada	5
	Confusa	4
	Palavras inapropriadas	3
	Palavras incompreensivas	2
	Nenhuma	1
Resposta motora	Obedece comandos	6
	Localiza dor	5
	Movimento de retirada	4
	Flexão anormal	3
	Extensão anormal	2
	Nenhuma	1

TOTAL MÁXIMO	TOTAL MÍNIMO	INTUBAÇÃO
15	3	8

**ATENÇÃO**

Exames de rotina em todos os politraumatizados

- Ht, Hb
- Grupo sanguíneo e fator Rh
- Amilase
- Radiografia de tórax AP
- Radiografia de bacia AP
- Radiografia de coluna cervical
- ECG
- $\beta$ HCG na mulher em idade fértil
- Ultra-som do abdômen total

**POLITRAUMATISMO**