


## URGÊNCIAS VASCULARES



Os serviços de cirurgia vascular da SES/DF são encontrados nos seguintes hospitais:

HBDF (Emergência 24 horas) – Ambulatório;


HRT – Ambulatório (Pareceres);

HRC – Ambulatório (Pareceres);


HRS – Ambulatório (Pareceres).

## TRAUMAS VASCULARES

### SINAIS



## TROMBOEMBOLIA ARTERIAL




## SINAIS E SINTOMAS

Dor	Presente
Edema	Ausente
Temperatura	Diminuída
Perfusão	Diminuída
Imobilização	Sim
Empastamento Muscular	Não
Cianose/Palidez	Sim
Sensibilidade	+++
Insuficiência Funcional	Sim
Início	Súbito

**OBS:** Encaminhar o paciente ao serviço de emergência urgente.

## TROMBOSE VENOSA PROFUNDA TVP



## TVP - SINAIS E SINTOMAS

Dor	Presente
Edema	Presente
Temperatura	Normal / Aumentada
Perfusão	Normal
Imobilização	Não
Empastamento Muscular	Sim
Cianose/Palidez	Não
Sensibilidade	+
Insuficiência Funcional	Não
Início	Lento

### OBS:

(\*) Ecodoppler poderá ser realizado em qualquer regional que possua médico especialista (radiologista ou cirurgião vascular) e aparelho, para confirmação ou não do diagnóstico.

1. Procurar encaminhar os pacientes aos ambulatórios das regionais que possuam especialistas (cirurgiões vasculares) para seguimento e controle preferencialmente no período diurno (segundas a sextas-feiras) em face de não haver plantonistas de ecodoppler à noite ou finais de semana.

(\*) HBPM - Heparina de Baixo Peso Molecular


# PÉ DIABÉTICO

## PRINCIPAIS QUEIXAS

Dor  
Dormência  
Úlceras  
Ferimentos

## PRINCIPAIS SINAIS DE COMPLICAÇÕES

Palidez  
Cianose  
Diminuição de temperatura  
Ausência ou diminuição de pulsos



### OBSERVAÇÕES:

Encaminhar apenas os pacientes isquêmicos aos serviços regionais de Cirurgia Vascular através de solicitação de Parecer Médico. Os demais casos deverão ser resolvidos pela Cir. Geral, Ortopedia ou Endocrinologia – Serviços de Pé Diabético das regionais de origem.

## ANEURISMAS

