



# Classificação de Angina Instável

(Braunwald)

## GRAVIDADE

- Classe I      Angina de início recente, grave ou acelerada  
Paciente com angina a menos de dois meses, grave, ou ocorrendo mais de 3x ao dia.  
Angina evidentemente mais freqüente ou desencadeada nitidamente com esforços.  
Sem dor em repouso nos últimos 2 meses.
- Classe II      Angina de repouso, subaguda  
Pacientes com 1 ou mais episódios de dor em repouso durante o mês precedente.  
Sem dor em repouso nas últimas 48 horas.
- Classe III      Angina em repouso, aguda  
1 ou mais episódios de dor em repouso nas últimas 48 horas.

## CIRCUNSTÂNCIAS CLÍNICAS

- Classe A      Angina instável secundária  
Condição extrínseca ao leito coronariano, claramente identificável, que intensifique a isquemia miocárdica (anemia, infecção, febre, hipotensão, taquiarritmia, tireotoxicose, hipoxemia).
- Classe B      Angina instável primária
- Classe C      Angina pós-IAM  
Dentro de 2 semanas após IAM documentado.

## INTENSIDADE DO TRATAMENTO

- Classe 1      Ausência de tratamento ou tratamento mínimo.
- Classe 2      Ocorrendo na presença de tratamento padrão com doses convencionais de beta-bloq, nitrato e antag. de cálcio.
- Classe 3      Apesar de doses máximas toleráveis das 3 categorias, incluindo nitrato venoso.



# Classificação das Síndromes Anginosas

## CLASSIFICAÇÃO DA SOCIEDADE CANADENSE DE CARDIOLOGIA (CCSC)

Classe	Ativ. que evoca angina	Limitação p/ as ativ. normais
I	Exercícios Prolongados	Nenhuma
II	Caminhar > 2 blocos	Discreta
III	Caminhar < 2 blocos	Marcada
*IV	Aos mínimos esforços ou em repouso	Severa

Fonte: American Heart Association In: Grding of Angina Pectori-Cirulation, 1976; 54 : 522-523

## ESCALA MODIFICADA DA C.C.S.C\* PARA CLASSE IV

Classe IVA	Angina instável resolvida com terapêutica médica intensificada e estabilizada com medicações orais.
Classe IVB	Angina Instável parcialmente resolvida com terapia oral, mas os sintomas retornam com os mínimos esforços.
Classe IVC	Angina instável requerendo imediata monitorização e terapia parenteral ou mecânica (E.G. balão intra-aórtica)

Fonte: COX, J.L. & Naylor; C.N. - Limitations of Canadian Cardiovascular Society Classification of Angina Pectoris - JACV74. August, 1994

## FORMAS DE APRESENTAÇÃO DA ANGINA INSTÁVEL

- Angina de repouso dentro de 1 semana da apresentação
- Angina de início recente na CCSC classe III ou IV dentro de 2 meses da apresentação
- Angina em crescendo na CCSC para pelo menos classe III ou IV
- Angina variante (Prinzmetal)
- IAM sem onda Q (corrente lesão subendocárdia ao ECG)
- Angina pós-IAM (>24)

\*CCSC - Canadian Cardiovascular Society Classification

Fonte: Braunwald et al. - Diagnosing and Managing Unstable Angina - Circulation. Vol. 90, nº1 July. 1994