



ALBERT EINSTEIN
HOSPITAL ISRAELITA

Diretrizes Assistenciais

Protocolo de Atendimento à Vítima de Violência
Sexual em Pronto Socorro

Versão eletrônica atualizada em
março/2012

Protocolo de Atendimento à Vítima de Violência Sexual em Pronto Socorro

- 1.) Exame ginecológico completo, com descrição de órgãos genitais externos, região perianal e órgãos genitais internos. Descrever exame físico minuciosamente
- 2.) Colher material de fundo de saco vaginal com espátula de Ayre e fixar em papel filtro estéril. Colocar o papel em envelope com nome da paciente, anexar ao prontuário
- 3.) Solicitar:
 - a. Beta -HCG plasmático
 - b. Sorologias: hepatite B e C, sífilis, HIV, herpes
 - c. Pesquisa de gonorréia, clamídia, vaginose e tricomonas podem ser oferecidas no caso da paciente se recusar a fazer a profilaxia medicamentosa.
 - d. Coleta de material de fundo de saco (citada acima)
- 4.) Medicação
 - a. Levonorgestrel 1,5mg, dose única, para prevenção de gravidez
 - b. Ceftriaxona 125mg IM, dose única, para Gonorréia
 - c. Azitromicina, 1 grama, via oral, dose única. Para crianças e adolescentes com menos de 45 kg, usar 20mg/kg (máximo de 1,0gr). Prevenção de Clamídia
 - d. Secnidazol, 2 gramas, via oral, dose única, para prevenção de Tricomonas e vaginose
 - e. Penicilina Benzatina, 1.200.000UI, IM, dose única. Para crianças ou adolescentes com menos de 45 kg, usar 600.000UI, IM. Prevenção de sífilis
 - f. Profilaxia de hepatite B: vacina (1ª dose) Imunoglobulina, 0,06ml/kg de peso, IM. Aplicar a imunoglobulina em extremidade diferente da vacina. Essas medicações não são necessárias para indivíduos imunizados. A gravidez e lactação não são contra-indicações.

g. Profilaxia de HIV: Indicada no caso de múltiplos parceiros, relação anal, presença de sangramento ou lesões. Sempre deve ser discutida e oferecida à paciente. Não é necessária se não houver ejaculação. Medicação:

1. Biovir® (Zidovudina + Lamivudina): 1 cp, via oral, de 12/12 horas, por 4 semanas
2. Crixivan® (Indinavir): 2cp (800mg), via oral, de 8/8horas, por 4 semanas.

**OBS: o Metronidazol e outros derivados imidazólicos podem apresentar interações medicamentosas com o Ritonavir. O uso concomitante deve ser evitado. Postergar o uso dos derivados imidazólicos.*

- h. Fornecer medicação anti-retroviral para 2 dias e encaminhar a paciente para centro de DST/AIDS ou serviço de atendimento à violência sexual para conseguir o resto da medicação
- i. Em nenhuma hipótese o profissional deve encaminhar à paciente ao IML sem antes proceder ao exame físico e o registro do atendimento. O encaminhamento ao IML não é obrigatório.
- j. Encaminhar para seguimento ambulatorial: psicologia, novas sorologias em 6 meses.