



ALBERT EINSTEIN
HOSPITAL ISRAELITA

Protocolo

Gestantes com Síndrome Gripal

Versão eletrônica atualizada em
março/2012



Gestante com Síndrome Gripal

Gestante com doença aguda (com duração máxima de cinco dias), apresentando febre (ainda que referida) acompanhada de tosse ou dor de garganta, na ausência de outros diagnósticos.

- Colocar máscara cirúrgica na gestante
- Atender com máscara
- Iniciar Oseltamivir 75mg vo 12/12h 5 dias
- Definir Gravidade:

Caso Grave = Internação

- Gestante com febre superior a 38°C, tosse e dispnéia, acompanhada ou não de dor de garganta e/ou:
- Aumento da frequência respiratória (>25 irpm)
- Hipotensão em relação a pressão arterial habitual do paciente
- Radiografia de tórax: infiltrado intersticial localizado ou difuso ou presença de área de condensação.

Caso Não Grave

- Tratamento completo com Oseltamivir
- Orientação de observação domiciliar
- Retorno se piora dos sintomas

Internação, se um destes sinais abaixo encaminhar para UTI:

- Dificuldade respiratória evidente
- Cianose
- Escarro hemoptóico
- Dor torácica
- Sonolência/ rebaixamento do nível de consciência
- Piora da hipotensão arterial