

NOMOGRAMA DE HEPARINIZAÇÃO NO PACIENTE NEUROLÓGICO
Neurointensiva - HIAE

Folha no _____

Leito: _____ Data: _____

Peso (Kg): _____ Altura (cm): _____

Bolus: Sim _____ UI Não

Instruções :

- Coletar TP, TTPa, plaquetas, fibrinogênio, Hb, Ht, leucograma antes de iniciar a infusão,
- **Bolus** somente se indicado pelo médico assistente e/ou plantonista
- Dose do *bolus* : 50 UI / Kg, no máximo 5000 UI, EV

• **DILUIÇÃO PADRÃO:** Heparina 12500 UI (2,5 mL) + SF 0,9% 250 mL (= 50 UI/ mL)

- Coletar TTPa a cada 6h após início da infusão e manter em prescrição TTPa de 6/6 h
- Iniciar a infusão ajustada para o peso, conforme especificado na Tabela 1
- Ajustar a infusão a cada 6h conforme resultado do TTPa, seguindo a Tabela 2
- Anotar os ajustes de doses na Tabela 3, enquanto durar o tratamento
- Não estão previstos *bolus* adicionais durante a infusão
- Comunicar o médico e suspender heparina se piora neurológica e/ou sangramento ativo

DOSE INICIAL:

Tabela 1

Peso (Kg)	ml / h
< 50	10
50-59	12
60-69	14
70-79	16
80-89	18
90-99	20
100-109	22
110-119	24
> 119	28

AJUSTE PARA INFUSÃO CONTÍNUA:

Tabela 2

TTPa (seg)	Parar infusão	Ajuste da Dose
< 40	-	↑ 5 mL/h
40-49	-	↑ 3 mL/h
50-59	-	↑ 2 mL/h
60-90	-	manter
91-100	-	↓ 2 mL/h
101-120	-	↓ 3 mL/h
> 120	Por 60 min	↓ 5 mL/h

Tabela 3

Data / Hora	TTPa prévio	Infusão prévia	TTPa atual	Infusão atual	Responsável