

Fluxograma de Tratamento da Doença Falciforme Hidroxiuréia

Critérios de Inclusão

- diagnóstico laboratorial de doença falciforme (HbSS), Sβ-Talassemia (HbSβ), HbSC ou HbSD, por eletroforese de hemoglobina
- idade >18 anos: se entre 4 e 18 anos, considerar a relação risco-benefício
- capacidade de comparecer às revisões periódicas e de se submeter a exames laboratoriais a cada duas semanas
- teste de gravidez (β-HCG sérico) negativo
- pelo menos uma das seguintes complicações nos últimos 12 meses:
 - 3 ou mais episódios de crises vaso-oclusivas com necessidade de atendimento médico;
 - crise torácica aguda recidivante;
 - 1 ou mais acidentes vasculares encefálicos ou ataques isquêmicos transitórios;
 - 1 episódio de priapismo grave pós-puberal ou priapismo recorrente;
 - anemia grave e persistente (Hb < 6 g/dl em três dosagens no período de 3 meses).

Critérios de Exclusão

- Hipersensibilidade à hidroxiuréia
- Gestação
- Infecção pelo HIV
- Qualquer das evidências abaixo de disfunção medular:
 - leucócitos < 2.500/ mm³
 - neutrófilos < 2.000/ mm³
 - plaquetas < 100.000/ mm³
 - hemoglobina < 4,5 g/dl
 - reticulócitos < 80.000/ mm³ (quando hemoglobina < 9 g/dl);

