

ANTIBIOTICOTERAPIA



www.abcinfeccao.com.br

ANTIBIOTICOTERAPIA

PROFILAXIA CIRÚRGICA

- ⌘ Parto normal: nada
- ⌘ Cesárea: Kefazol 1g - dose única após clampeamento do cordão
- ⌘ Cesárea com grande manipulação: Kefazol 1g - dose única
- ⌘ Cesárea em diabética: Kefazol 1g - dose única

ANTIBIOTICOTERAPIA

INFECÇÃO URINÁRIA

⌘1o.lugar: E. coli

⌘2o.lugar: Proteus e enterococo

⌘3o lugar: Klebsiella

⌘Outros: Pseudomonas, Serratia

⌘Conhecer a epidemiologia local

ANTIBIOTICOTERAPIA

INFECÇÃO URINÁRIA

	1a. ESCOLHA	2a. ESCOLHA	3a. ESCOLHA
<i>E. coli</i>	NORFLOXACIN	CIPROFLOXACIN	Sob antibiograma
<i>Proteus</i>	NORFLOXACIN	CIPROFLOXACIN	Sob antibiograma
Enterococo	AMOXICILINA	AMPICILINA	VANCOMICINA
<i>Klebsiella</i>	CEFALEXINA	Sob antibiograma	
<i>Pseudomonas</i>	NORFLOXACIN	CIPROFLOXACIN	Sob antibiograma
<i>Serratia</i>	Sob antibiograma		
	www.abcinfeccao.com.br		
Outros	Sob antibiograma		

ANTIBIOTICOTERAPIA

PNEUMONIA COMUNITÁRIA (PAC)

⌘1o.lugar: Pneumococo

⌘2o.lugar: *Haemophyllus influenzae*

⌘3o.lugar: *Klebsiella, Enterobacter*

⌘4o.lugar: *S. aureus*

⌘Outros (atípicos):

Legionella, Chlamydia, Mycoplasma

ANTIBIOTICOTERAPIA

PAC SEM AGENTE:

< 60 ANOS

AMPICILINA

> 48 horas

Associar GENTA,
AZITRO ou LEVO

> 60 ANOS

CEFTRIAXONA

> 48 horas

Associa

AZITRO ou LEVO

Se aspirou

Associar METRONIDAZOL

ANTIBIOTICOTERAPIA

AGENTE	1a.escolha	2a.escolha	3a.escolha
<i>Pneumococo</i>	Penicilina	Ampicilina	Amoxicilina
<i>H. influenzae</i>	Ceftriaxona		
<i>Klebsiella</i>	Ceftriaxona		Cefepime
<i>Enterobacter</i>	Ceftriaxona		Cefepime
<i>S. aureus</i>	Oxacilina	Cefazolina	Vancomicina
{ <i>Legionella</i>	{ Azitromicina		
{ <i>Chlamydia</i>	{ Claritromicina		
{ <i>Mycoplasma</i>	{ Levofloxacina		

ANTIBIOTICOTERAPIA

ESBL

(Extended Spectrum BetaLactamases)

Antibiograma **S** *in vitro* mas
não responde clinicamente a:

- ④ Ceftriaxona
- ④ Ceftazidima
- ④ Aztreonam

Só responde a Carbapenêmicos

www.abcinfeccao.com.br