

Descrição

Descrição

Descrição

Guia de antibióticos / antifúngicos

Antibioticoterapia Endovenosa para RNs com peso ao nascimento ≤ 2.000 g

Peso Período	P < 1.200 g 0 a 4 semanas		P: 1.200 a 2.000 g 0 a 7 dias		P: 1.200 a 2.000 g > 7 dias	
	(dose) mg/kg	intervalo	mg/Kg	intervalo	mg/Kg	intervalo
Amicacina	7,5	18/18 ou 24/24 h	7,5	12/12 h	7,5 a 10	12/12 h
Gentamicina	2,5	24/24 h	2,5	18/18 h	2,5	12/12 h
Tobramicina	2,5	18/18 h	2,5	12/12 h	2,5	8/8 h
Aztreonam	30	12/12 h	30	12/12 h	30	8/8 h
Cefotaxima	50	12/12 h	50	12/12 h	50	8/8 h
Ceftazidima	50	12/12 h	50	12/12 h	50	8/8 h
Ceftriaxona	50	24/24 h	50	24/24 h	50	24/24 h
Meropenem*	20	12/12 h	20	12/12 h	20	12/12 h
Imipenem	20	18/18 ou 24/24 h	20	12/12 h	20 a 25	8/8 h
Clindamicina	5	12/12 h	5	12/12 h	5	8/8 h
Oxacilina	50	12/12 h	50	12/12 h	50	8/8 h
Ampicilina*	50	12/12 h	50	12/12 h	50	8/8 h
Penicilina*	50.000 U	12/12 h	50.000 U	12/12 h	50.000 U	8/8 h
Vancomicina##	15	24/24 h	10-15	12/12 h	10 a 15	8/8 ou 12/12 h
Metronidazol	7,5	48/48 h	7,5	24/24 h	7,5	12/12 h
Anfotericina B**	0,25	24/24 h	0,25	24/24 h	0,25	24/24 h
Anf. Lipossomal***	4	24/24 h	4	24/24 h	4	24/24 h
Cefepime	30	12/12 h	30	12/12 h	50	12/12 h

* Dobrar a dose na meningite • ** Aumentar 0,25/dia até 1 mg. • *** Aumentar até 8 mg/kg/dia • ## Dose na meningite: 60 mg/kg/d. 6/6h (15 mg/kg/dose)

Antibioticoterapia endovenosa para RNs com peso ao nascimento > 2.000 g

Período	0-7 dias		> 7 dias	
	mg/Kg	intervalo	mg/Kg	intervalo
Amicacina	7,5-10	12/12 h	7,5 a 10	12/12 h
Gentamicina	2,5	12/12 h	2,5	12/12 h
Tobramicina	2,5	12/12 h	2,5	8/8 h
Aztreonam	30	8/8 h	30	6/6 h
Cefotaxima	50	8/8 ou 12/12 h	50	6/6 ou 8/8 h
Ceftazidima	50	8/8 ou 12/12 h	50	8/8 h ou 12/12 h
Ceftriaxona	50	24/24 h	50	24/24 h
Meropenem*	25	12/12 h	25	8/8 h
Imipenem	20	12/12 h	20 a 25	8/8 h
Clindamicina	5	8/8 h	5 a 10	6/6 ou 8/8 h
Oxacilina	50	12/12 h	50	12/12 h
Ampicilina*	50	12/12 h	50	8/8 h
Penicilina*	100.000 U	12/12 h	100.000 U	12/12 h
Vancomicina##	10-15	12/12 h	10-15	8/8 h
Metronidazol	7,5	12/12 h	15	12/12 h
Anfotericina B**	0,25	24/24 h	0,25	24/24 h
Anf. Lipossomal***	4	24/24 h	4	24/24 h
Cefepime	50	12/12 h	50	12/12 h

Observações

Meningite por EGB → Ampicilina 400 mg/kg/dia, de 6/6 h

Outras doses:

- **Caspofungin** (Cancidas): 50 mg/m², 1 vez/dia
- **Ciprofloxacina**: 7 a 40 mg/kg/dia, dividido de 12/12 h

Referência: *Pediatric Dosage Handbook, 2009-2010: Neonatal dosing, 16th edition*

38

Guia de Antibióticos / Antifúngicos