

Sintomas de Hipoglicemia

SINTOMAS ADRENÉRGICOS: Sudorese, Taquicardia, Fome súbita, Fraqueza, Palidez, Ansiedade, Tremor.

SINTOMAS NEUROGLICOPÊNICOS: Letargia, Confusão, Astenia, Tontura, Sonolência, Dificuldade de concentração, Lentificação de pensamento, Alterações de comportamento, Déficit neurológico focal, Convulsão, Coma.

Medir Glicemia capilar

GLICEMIA CAPILAR < 70 mg/dL

Paciente consciente.

Capaz de alimentar-se

Oferecer 15 gramas de carboidrato de absorção rápida.

Exemplo:
150 ml de chá ou água com
1 colher de sopa rasa de açúcar.

- Incapaz de engolir
- Jejum para procedimento
- Nutrição via enteral ou parenteral

**Glicose hipertônica EV
50% 20 mL**

Paciente com alteração
do nível de consciência.

**Glicose hipertônica EV
50% 30 mL**

Repetir Glicemia capilar após **15 minutos**
Se necessário, repetir conduta acima

Hipoglicemia persistente > 30 minutos?

Não

Sim

Iniciar soro glicosado EV
5% 100 mL/h ou 10% 50 mL/h

Controle da Glicemia capilar a cada **15 minutos** até 2 dosagens no alvo

Hipoglicemia tratada

Considerar possíveis causas da hipoglicemia
Corrigir aporte calórico para prevenção de novos episódios